

Winter 2026, Volume 12, Issue 2

Comparison of the effect of Frequency Spectrum Fatigue on the Ground Reaction Forces on the Foot During the Change up Change in Healthy Taekwondo athletes and those with ACL Injury

Mohsen Barghamadi^{1*}, Sara Imani Brouj², Nima Moludi³, Hamed Sheikhalizadeh²

1- Assistant Prof. of Sport Biomechanics, Dept. of Physical education and Sport Science, Faculty of Educational Science and psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

2- PhD student of Sport Biomechanics, Dept. of Physical Education and Sport Science, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

3- MSc in Sport Physiology, Dept of Physical Education and Sport Science, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

***Corresponding Author:** Mohsen Barghamadi, Associate Professor, Department of Sport Biomechanics, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

Email: Barghamadi@uma.ac.ir

Received: 2025/05/29

Accepted: 2025/12/3

Abstract

Introduction: Combat sports, due to the frequent use of upper and lower limb strikes, often induce fatigue, which can reduce both static and dynamic balance. Accordingly, the present study aimed to compare the effects of fatigue on the frequency spectrum of ground reaction forces during the Ap Chagi kick in healthy taekwondo practitioners and those with anterior cruciate ligament injury.

Methods: This study employed a quasi-experimental, laboratory-based design. Participants included 15 male athletes with ACL injury and 15 healthy male athletes. GRF variables were recorded using a force plate, and all force amplitudes were normalised to body weight. The Shapiro–Wilk test was applied to verify the normality of data distribution. Statistical analyses were conducted using a two-way repeated-measures ANOVA with a significance level set at $p \leq 0.050$. All analyses were performed using SPSS version 26.

Results: The main effect of time on the 99.5% power frequency component in the mediolateral direction was significantly lower in the post-test than in the pre-test ($p = 0.048$; $d = 0.175$). Conversely, the main effect of time on the 99.5% power frequency component in the vertical GRF was significantly higher in the post-test compared to the pre-test ($p = 0.036$; $d = 0.052$). Moreover, the time \times group interaction revealed that post-test vertical GRF values in the ACL-injured group were 35.76% higher than those in the healthy group ($p = 0.045$; $d = 0.089$).

Conclusion: The findings demonstrate that fatigue induces greater alterations in the frequency characteristics of GRFs in ACL-injured taekwondo practitioners compared to healthy athletes. This pattern reflects a decline in neuromuscular efficiency, reduced functional stability, and slower execution of motor skills. The results highlight the need for targeted training and rehabilitation interventions to improve frequency-domain parameters and enhance dynamic stability in athletes with a history of ACL injury.

Keywords: Up-chuggy, Frequency spectrum of ground reaction force, ACL Injury, Taekwondo.

مقایسه اثر خستگی بر طیف فرکانس نیروی های عکس العمل زمین وارده بر پا هنگام ضربه آپ چاگی در تکواندو کاران سالم و دارای آسیب ACL

محسن برغمندی^{۱*}، سارا ایمانی بروج^۲، نیما مولودی^۳، حامد شیخ علیزاده^۲

۱- دانشیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 ۲- دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 ۳- کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

*نویسنده مسئول: محسن برغمندی، دانشیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

ایمیل: Barghamadi@uma.ac.ir

پذیرش مقاله: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

دریافت مقاله: ۱۴۰۴/۰۳/۸

چکیده

مقدمه: ورزش های رزمی علت استفاده زیاد از ضربات دست و پا موجب خستگی می شود که این امر باعث کاهش تعادل ایستا و پویا در افراد می شود. از این رو هدف از این پژوهش مقایسه اثر خستگی بر طیف فرکانس نیروی های عکس العمل زمین وارده بر پا هنگام ضربه آپ چاگی در تکواندو کاران سالم و دارای آسیب ACL بود.

روش کار: این تحقیق از نوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی بود. در این پژوهش ۱۵ مرد دارای آسیب ACL و ۱۵ مرد سالم شرکت داشتند. متغیرهای نیروی عکس العمل زمین با استفاده از دستگاه صفحه نیرو اندازه گیری شد. دامنه نیروی عکس العمل زمین نسبت به وزن بدن نرمال شد. جهت بررسی نرمال بودن توضیح داده ها از آزمون شاپیروویلیک استفاده شد. جهت تحلیل داده های آماری نیز از آزمون آنالیز واریانس دوسویه با اندازه های تکراری در سطح معناداری ۰/۰۵۰ استفاده شد. تمام تحلیل ها با استفاده از نرم افزار Spss 26 انجام گردید.

یافته ها: یافته ها نشان داد اثر عامل زمان مولفه فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد در راستای داخلی- خارجی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون کمتر بود ($d=۰/۱۷۵$; $p=۰/۰۴۸$). اثر عامل زمان در مولفه فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد در مولفه نیروی عمودی عکس العمل زمین در پس آزمون نسبت به پیش آزمون بیشتر بود ($d=۰/۰۵۲$; $p=۰/۰۳۶$). نتایج نشان داد اثر تعاملی زمان×گروه در مقادیر مؤلفه نیروی عمودی عکس العمل زمین طی پس آزمون گروه دارای آسیب ACL به اندازه ۳۵/۷۶ درصد بیشتر از پس آزمون گروه سالم بود ($d=۰/۰۸۹$; $p=۰/۰۴۵$).

نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد خستگی در تکواندو کاران با آسیب ACL نسبت به افراد سالم، تغییرات بیشتری در ویژگی های فرکانسی نیروهای عکس العمل زمین ایجاد می کند. این وضعیت بیانگر افت کارایی عصبی-عضلانی، کاهش ثبات عملکردی و کندی اجرای مهارت ها بوده و بر لزوم مداخلات تمرینی و بازتوانی هدفمند برای بهبود ثبات دینامیکی تأکید دارد.

کلیدواژه ها: آپ چاگی، طیف فرکانس نیروی عکس العمل زمین، آسیب ACL، تکواندو.

مقدمه

در بین رشته های ورزشی، ماهیت ورزش های رزمی به گونه ای است که استفاده زیاد از ضربات دست و پا موجب خستگی می شود. خستگی باعث کاهش تعادل ایستا و پویا در افراد می شود (۱) و این در حالی است که تعادل در ورزش های رزمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ورزشکاران این رشته ها با خطر بالای برخورد و صدمات بدون برخورد در اندام ها به ویژه اندام تحتانی مواجه هستند. تکواندو به دلیل استفاده از ضربات پا در مقایسه با ضربات دستی (بیش از ۹۰ درصد) از هنرهای رزمی مشابه مانند کاراته و کونگ فو متمایز می شود (۲). تکواندو با حدود ۷۵ تا ۱۲۰ میلیون ورزشکار در بیش از ۱۴۰ کشور، یکی از پرطرفدارترین ورزش ها در جهان است (۳). یکی دیگر از عواملی که می تواند باعث آسیب شود، خستگی در حین تمرین و مبارزه است. فعالیت های تکراری در حین تمرین و مبارزه، سطوح مختلفی از خستگی را ایجاد می کند. خستگی وضعیتی است که باعث آسیب می شود (۴).

مطالعات فیزیولوژیکی نشان داده است که در طول فعالیت های کوتاه مدت و طولانی مدت، انقباض و فعالیت عضلانی تغییر می کند، بنابراین خستگی باعث تغییر در الگوهای حرکتی می شود (۵). یکی از شایع ترین آسیب ها در تکواندو پارگی ACL است. بیان شده است که بیشترین شیوع آسیب در این رشته ورزشی در ۵۲/۱ درصد مسابقات تکواندو رخ می دهد (۶). با توجه به ویژگی اصلی تکواندو، یعنی انجام حرکات روی یک پا، بار سنگینی به زانو وارد می شود که با از دست دادن تعادل، ACL به راحتی در معرض اضافه بار قرار می گیرد و بی احتیاطی ناشی از خستگی باعث آسیب می شود (۱). درصد بالای آسیب دیدگی در این ورزش ضرورت پیشگیری را بیش از پیش نشان می دهد. درک بیومکانیکی رابطه بین عملکرد اندام تحتانی در شرایط خستگی برای پیشگیری و درمان آسیب های اندام تحتانی مهم است. خستگی حالت بیومکانیکی مبارزه را تغییر می دهد (۷).

عوامل بالقوه دخیل در فرایند خستگی به دو دسته کلی عوامل مرکزی و عوامل محیطی تقسیم می شوند. عمده تحقیقاتی که تأثیر خستگی را بر فعالیت عضلات سنجیده اند، عضلات اندام تحتانی بدلیل اینکه کنترل کننده مرکز ثقل هستند و تمام حرکات از آن آغاز می شود بیشتر مورد اهمیت بوده است (۸). اختلال در این بخش می تواند

به کاهش کارایی عصبی-عضلانی منجر شود و توانایی زنجیره حرکتی را برای حفظ نیرو و ایجاد ثبات پویا کاهش دهد. در نتیجه به ایجاد الگوهای حرکتی جبرانی، جایگزین و ناکارآمد در سایر اندام ها منجر شود. این مسئله ممکن است سبب افزایش فشار مکانیکی بر ساختارهای انقباضی و بافت های غیرانقباضی شود و به تکرار ریز ضربه ها، بیومکانیک غیرطبیعی و صدمه بینجامد (۹). خستگی در ورزشکاران تکواندو ممکن است بر چابکی، کنترل وضعیت بدن و متغیرهای پویا تأثیر بگذارد. با این حال، بیشتر مطالعات تا به امروز فقط نیروی عکس العمل زمین مرتبط با یک تکنیک خاص را بررسی کرده اند مانند لی و هوانگ به بررسی نیروی عکس العمل زمین بین دو پا در طول یک ضربه ۳۶۰ درجه در حین گرم کردن پرداخته اند (۱۰، ۱۱). مسابقات تکواندو مستلزم ضربات دقیق و سریع به سمت هدف است، خستگی ناشی از فعالیت عضلانی مانع از بازخورد آوران شده و به حس عمقی مفصل و ویژگی های حرکتی آسیب می رساند (۱۲، ۱۳). تمرین های حداکثری انجام شده در مسابقات تکواندو ممکن است باعث ایجاد خستگی سیستمیک در ورزشکاران شود، لازم است اثرات خستگی بر عملکرد حرکات آپ چاگی، ثبات وضعیتی هنگام آپ چاگی و سایر متغیرهای سیستماتیک مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بررسی تأثیر خستگی بر طیف فرکانس نیروی عکس العمل زمین می تواند برای ورزشکاران تکواندو دارای اهمیت بسزایی باشد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی مقایسه اثر خستگی بر طیف فرکانس نیروی های عکس العمل زمین وارده بر پا هنگام ضربه آپ چاگی در تکواندو کاران سالم و دارای آسیب ACL پرداخته شد.

روش کار

روش این تحقیق از نوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی بود. با استفاده از اطلاعات مربوط به مطالعات پیشین و با استفاده از نرم افزار G*power، حجم نمونه آماری پژوهش حاضر ۱۵ نفر در هر گروه برآورد شد تا توان آماری ۰/۸ در سطح معنی داری ۰/۰۵ حاصل شود. بر همین اساس ۱۵ نفر افراد سالم و ۱۵ نفر دارای آسیب ACL انتخاب شدند. جامعه آماری این پژوهش مردانی با محدوده سنی ۱۸ تا ۲۶ سال بودند که بصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. هر یک از آزمودنی های تحقیق بر اساس معیارهای

اینکه شرکت کنندگان فشار درک شده ۱۳ یا بالاتر را گزارش کردند، سرعت تردمیل ثابت شد تا امکان دویدن در حالت پایدار فراهم شود. در طول این دوره حالت پایدار، داده‌های فشار درک شده و ضربان قلب هر ۳۰ ثانیه ثبت شد. حداکثر ضربان قلب با استفاده از معادله 220-age تعیین شد (۱۶). پروتکل خستگی با دو دقیقه دویدن در حالت پایدار بیشتر از ۱۷ در مقیاس بورگ یا بیشتر از ۸۰٪ از حداکثر ضربان قلب خاتمه یافت (۱۷). پس از آن‌ها بلافاصله پس از اعمال پروتکل خستگی انجام شد. پروتکل خستگی بر اساس وضعیت توانبخشی افراد شرکت کننده در ACLR بود و آزمون‌های اجرا و پروتکل خستگی امکان‌پذیر بودند (۱۸). معادلات طیف فرکانس

طیف گسسته، دامنه فرکانس به صورت مضرری از فرکانس پایه تعیین می شود، مجموع n هارمونیک برابر است با: رابطه (۱)

$$F(t) = \sum A_n \sin(n\omega \cdot t + \theta_n)$$

A_n = دامنه $\omega = 0$ فرکانس پایه $n =$ ضریب هارمونیک $\theta_n =$ زاویه فازی
برای ارزیابی محتوای فرکانس نیروی، شاخص‌های زیر محاسبه می شوند (۱۹، ۲۰). رابطه (۲)

$$\int_{f_{99.5}}^{f_{99.5}} p(f) df = 0.995 \times \int_{f_{max}}^{f_{max}} p(f) df$$

$p =$ توان محاسبه شده، $f_{max} =$ حداکثر فرکانس سیگنال، میانه فرکانس نیرو، میانه فرکانس در نقطه ای اتفاق می افتد که نیمی از توان سیگنال در بالا و نیمی دیگر در پایین آن قرار دارد. رابطه (۳)

$$\int_0^{f_{med}} p(f) df = \int_{f_{med}}^{f_{max}} p(f) df$$

$f_{max} =$ حداکثر فرکانس سیگنال
 $f_{med} =$ میانه فرکانس سیگنال
پهنای باند فرکانس نیرو برابر با تفاوت بین فرکانس حداکثر و حداقل است. توان سیگنال برابر با توان هارمونی‌های بیشتر از نصف حداکثر توان سیگنال باشد.

ورود شامل: جنسیت مرد، تکمیل فرم رضایت فردی، عدم اختلاف در اندام‌های تحتانی و همچنین عدم سابقه ابتلا به آسیب‌های اسکلتی-عضلانی خصوصاً در ناحیه اندام تحتانی در گروه سالم بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین جنسیت ورزشکار مرد، آسیب ACL در یک پا (آسیب در مسابقات تکواندو)، داشتن دامنه حرکتی کامل در مفصل زانو، گذشت شش ماه از جراحی، توانایی راه رفتن مستقل و عدم استفاده از هرگونه بریس یا زانوبند از شرایط ورود به تحقیق بیماران آسیب ACL بود. طبق پرونده پزشکی آزمودنی‌ها تمامی افرادی که در گروه ACL قرار گرفته بودند پارگی کامل ACL داشتند که به روش جراحی آرتروسکوپی عمل شده بودند. طی فراخوان صورت گرفته تنها ۱۵ نفر از دانشجویان دانشگاه شرایط ورود به تحقیق در گروه آسیب ACL را داشتند، که به صورت هدفمند انتخاب شدند. در نهایت ۱۵ مرد سالم و ۱۵ مرد دارای آسیب ACL به محیط آزمایشگاه دعوت شدند. پای برتر آزمودنی‌ها توسط آزمون شوت توپ مشخص گردید (۱۴). تمام آزمودنی‌ها راست پا بودند.

پس از توجیه آزمودنی‌ها و با رعایت ملاحظات اخلاقی از آزمودنی‌ها خواسته شد با برتن داشتن لباس ورزشی به اندازه ۱۰ دقیقه عمل گرم کردن را انجام دهند. سپس آزمودنی‌های روی صفحه نیرو ایستاده و تکنیک آپ چاگی را اجرا نمودند. هر آزمودنی ۵ مرتبه تکنیک آپ چاگی را به عنوان پیش آزمون انجام داد و در این حین نیروی عکس العمل زمین ثبت شد. سپس پروتکل خستگی انجام شد و پس از آن مجدد داده‌های نیروی عکس العمل زمین در حین حرکت آپ چاگی ثبت شد. داده‌های کنتیکی با استفاده از فیلتر باترورث مرتبه چهار با برش فرکانسی ۲۰ هرتز نرمال شدند.

پروتکل خستگی

پروتکل خستگی فیزیکی شامل دویدن با کفش ورزشی روی تردمیل بدون شیب (Horizon Horizon Fitness, Omega GT, USA) بود، در حالی که ضربان قلب به طور مداوم کنترل می‌شد (Polar Polar RS100, Polar Electro Oy, Woodbury, NY). شرکت کنندگان آزمون را با سرعت ۶ کیلومتر در ساعت شروع کردند و سرعت تردمیل هر ۲ دقیقه ۱ کیلومتر در ساعت افزایش یافت. میزان فشار درک شده در پایان هر مرحله با استفاده از مقیاس بورگ (۶-۲۰) نقطه‌ای از شرکت کنندگان گرفته شد (۱۵). به محض

یافته‌ها

نتایج مقادیر طیف فرکانس نیروی عکس‌العمل زمین و گشتاور آزاد در هنگام حرکت آپ‌چاگی در تکواندو کاران سالم و دارای آسیب ACL در جدول ۱ نشان داده شده است. یافته‌ها نشان داد اثر عامل زمان مولفه فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد در راستای داخلی-خارجی در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون کمتر بود ($d=0/175$; $p=0/048$). اثر عامل زمان در مولفه فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد در مولفه نیروی عمودی عکس‌العمل زمین در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون بیشتر بود ($d=0/052$; $p=0/036$). همچنین اثر عامل زمان مولفه هارمونی ضروری در راستای داخلی-خارجی در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون کمتر بود ($p=0/036$; $d=0/052$) (جدول ۱).

نتایج نشان داد اثر تعاملی زمان × گروه در مقادیر مؤلفه نیروی عمودی عکس‌العمل زمین طی پس‌آزمون گروه دارای آسیب ACL به اندازه ۳۵/۷۶ درصد بیشتر از پس‌آزمون گروه سالم بود ($d=0/089$; $p=0/045$). بعلاوه اثر تعاملی زمان × گروه در مقادیر مؤلفه فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد در گشتاور آزاد طی پس‌آزمون گروه دارای آسیب ACL به اندازه ۴۰/۴۶ درصد بیشتر از پس‌آزمون گروه سالم بود ($d=0/346$; $p=0/017$) (جدول ۱).

$$f_{band} = f_{max} - f_{min} \text{ (when } p > 1/2 \times P_{max} \text{)}$$

f_{max} = حداکثر فرکانس سیگنال

f_{min} = حداقل فرکانس سیگنال

f_{band} = پهنای باند سیگنال

p_{max} = حداکثر توان سیگنال

شاخص چهارم تعیین تعداد هارمونی‌های ضروری در هر راستا بود. که بر طبق روش‌شناسی، تعداد هارمونیک ضروری n_e برای بازسازی سطح ۹۵٪ از داده‌ها به عنوان تعدادی از هارمونیک‌ها که مجموع دامنه‌های نسبی هر هارمونیک در کل دامنه کمتر یا برابر با ۰/۹۵ در نظر گرفته شد (۲۱).

رابطه (۵)

$$\sum_{n=1}^{n_e} \frac{\sqrt{A_n^2 + B_n^2}}{\sum_{n=1}^m \sqrt{A_n^2 + B_n^2}} \leq 0.95$$

جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون شاپیروویلیک استفاده شد. جهت تحلیل داده‌های آماری نیز از آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری استفاده شد. تمام تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss26 انجام گردید.

جدول ۱. میانگین و انحراف استاندارد مولفه‌های طیف فرکانس نیروی عکس‌العمل زمین و گشتاور آزاد در هنگام حرکت آپ‌چاگی در تکواندو کاران سالم و دارای آسیب ACL

متغیرها	پارامترها	گروه دارای آسیب ACL		گروه بدون آسیب ACL		سطح معناداری	
		پیش‌آزمون	پس‌آزمون	پیش‌آزمون	پس‌آزمون	زمان × گروه	گروه
فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد		۲۰/۱۵ ± ۷/۴۹	۱۴/۰۰ ± ۶/۸۴	۱۵/۵۰ ± ۶/۶۸	۱۶/۴۹ ± ۹/۴۴	* ۰/۰۴۸ (۰/۱۷۵)	۰/۳۵۷ (۰/۰۶۶)
		۲۰/۱۵ ± ۷/۴۹	۱۴/۰۰ ± ۶/۸۴	۱۵/۵۰ ± ۶/۶۸	۱۶/۴۹ ± ۹/۴۴		۰/۵۷۵ (۰/۰۱۴)
تعداد هارمونی‌های ضروری		۲۰/۲۵ ± ۸/۵۸	۱۶/۱۹ ± ۵/۱۳	۱۴/۴۹ ± ۳/۸۴	۱۶/۱۲ ± ۵/۹۱	* ۰/۰۳۶ (۰/۰۵۲)	۰/۳۲۲ (۰/۰۸۴)
		۲۰/۲۵ ± ۸/۵۸	۱۶/۱۹ ± ۵/۱۳	۱۴/۴۹ ± ۳/۸۴	۱۶/۱۲ ± ۵/۹۱		۰/۱۸۲ (۰/۱۴۶)
میان‌فرکانس		۲/۵۰ ± ۰/۷۵	۲/۶۲ ± ۰/۹۱	۲/۷۵ ± ۰/۸۸	۲/۳۷ ± ۰/۷۴	۰/۵۴۹ (۰/۰۱۸)	۱/۰۰۰ (۰/۰۰۰)
		۲/۵۰ ± ۰/۷۵	۲/۶۲ ± ۰/۹۱	۲/۷۵ ± ۰/۸۸	۲/۳۷ ± ۰/۷۴		۰/۶۴۲ (۰/۰۴۸)
پهنای باند فرکانس		۱/۶۳ ± ۰/۷۹	۱/۶۲ ± ۰/۴۴	۱/۷۵ ± ۰/۹۳	۱/۳۷ ± ۰/۴۰	۰/۷۵۱ (۰/۰۱۹)	۱/۰۰۰ (۰/۰۰۰)
		۱/۶۳ ± ۰/۷۹	۱/۶۲ ± ۰/۴۴	۱/۷۵ ± ۰/۹۳	۱/۳۷ ± ۰/۴۰		۰/۳۲۹ (۰/۰۷۳)
فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد		۸/۸۰ ± ۱/۴۳	۷/۷۵ ± ۲/۰۲	۷/۰۵ ± ۴/۸۰	۷/۴۰ ± ۴/۵۰	۰/۲۶۳ (۰/۰۸۹)	۰/۱۰۲ (۰/۱۷۹)
		۸/۸۰ ± ۱/۴۳	۷/۷۵ ± ۲/۰۲	۷/۰۵ ± ۴/۸۰	۷/۴۰ ± ۴/۵۰		۰/۸۳۶ (۰/۰۰۳)
تعداد هارمونی‌های ضروری		۱۹/۵۴ ± ۴/۸۹	۲۰/۲۱ ± ۵/۸۸	۱۸/۱۵ ± ۴/۷۲	۱۶/۶۴ ± ۶/۸۳	۰/۴۵۹ (۰/۰۲۹)	۰/۶۴۹ (۰/۰۸۲)
		۱۹/۵۴ ± ۴/۸۹	۲۰/۲۱ ± ۵/۸۸	۱۸/۱۵ ± ۴/۷۲	۱۶/۶۴ ± ۶/۸۳		۰/۷۸۹ (۰/۰۰۸)
میان‌فرکانس		۲/۵۰ ± ۰/۷۶	۲/۳۶ ± ۰/۷۵	۲/۶۰ ± ۰/۸۹	۲/۵۰ ± ۰/۷۶	۰/۶۴۵ (۰/۰۱۶)	۰/۶۸۰ (۰/۰۱۳)
		۲/۵۰ ± ۰/۷۶	۲/۳۶ ± ۰/۷۵	۲/۶۰ ± ۰/۸۹	۲/۵۰ ± ۰/۷۶		۱/۰۰۰ (۰/۰۰۰)
پهنای باند فرکانس		۱/۵۰ ± ۰/۷۶	۱/۳۶ ± ۰/۷۵	۱/۶۰ ± ۰/۸۹	۱/۵۰ ± ۰/۷۶	۰/۶۴۵ (۰/۰۱۶)	۰/۵۹۱ (۰/۰۱۱)
		۱/۵۰ ± ۰/۷۶	۱/۳۶ ± ۰/۷۵	۱/۶۰ ± ۰/۸۹	۱/۵۰ ± ۰/۷۶		۱/۰۰۰ (۰/۰۰۰)

محسن برغمندی و همکاران

								فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد	
* -/۰۴۵ (۰/۰۸۹)	-/۰۶۲۸ (۰/۰۳۳)	* -/۰۳۷ (۰/۰۷۲)	۱۱/۰۱ ± ۴/۱۶	۱۲/۷۲ ± ۴/۴۹	۱۷/۱۲ ± ۴/۴۹	۱۲/۶۱ ± ۵/۸۳			
-/۰۷۳۴ (۰/۰۲۲)	-/۰۵۳۹ (۰/۰۳۱)	-/۰۶۰۲ (۰/۰۳۰)	۱۵/۷۴ ± ۴/۶۹	۱۹/۳۲ ± ۸/۴۹	۱۶/۴۶ ± ۵/۶۴	۱۸/۴۶ ± ۶/۳۲	تعداد هارمونی های ضروری	مولفه ی نیروی عمودی عکس العمل زمین	
-/۰۶۴۵ (۰/۰۱۶)	-/۰۷۰۱ (۰/۰۱۱)	۱/۰۰۰ (۰/۰۰۰)	۲/۶۲ ± ۰/۷۵	۲/۷۵ ± ۰/۷۳	۲/۶۲ ± ۰/۸۹	۲/۵۰ ± ۰/۷۴	میانۀ فرکانس		
-/۰۶۴۵ (۰/۰۱۶)	-/۰۷۰۱ (۰/۰۱۱)	۱/۰۰۰ (۰/۰۰۰)	۱/۶۲ ± ۰/۷۵	۱/۷۵ ± ۰/۷۳	۱/۶۲ ± ۰/۸۹	۱/۵۰ ± ۰/۷۴	پهنای باند فرکانس		
* -/۰۱۷ (۰/۳۴۶)	-/۰۴۵۰ (۰/۰۴۱)	-/۰۱۵۰ (۰/۱۴۲)	۱۴/۳۶ ± ۵/۷۹	± ۱۰/۳۸ ۱۷/۵۰	۲۴/۱۲ ± ۹/۴۷	۱۲/۵۹ ± ۵/۶۷	فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد		
-/۰۵۸۷ (۰/۰۲۴)	-/۰۳۴۸ (۰/۰۴۹)	-/۰۰۷۹ (۰/۱۷۹)	۱۵/۳۸ ± ۶/۴۶	۱۴/۲۶ ± ۲/۱۵	۱۸/۳۷ ± ۳/۳۹	۱۷/۶۸ ± ۴/۱۷	تعداد هارمونی های ضروری	مولفه های گشتاور آزاد	
-/۰۷۱۵ (۰/۰۱۹)	۱/۰۰۰ (۰/۰۰۰)	۱/۰۰۰ (۰/۰۰۰)	۲/۵۰ ± ۰/۷۶	۲/۳۸ ± ۰/۷۵	۲/۳۸ ± ۰/۷۵	۲/۵۰ ± ۰/۷۶	میانۀ فرکانس		
-/۰۷۱۵ (۰/۰۱۹)	۱/۰۰۰ (۰/۰۰۰)	۱/۰۰۰ (۰/۰۰۰)	۱/۵۰ ± ۰/۷۶	۱/۳۸ ± ۰/۷۵	۱/۳۸ ± ۰/۷۵	۱/۵۰ ± ۰/۷۶	پهنای باند فرکانس		

* سطح معناداری کمتر یا مساوی با نیم می باشد ($P < 0.05$).

بحث

ناپایداری، لرزش و لغزش در الگوی حرکتی می گردد (۲۰)، جیانیهیا و همکاران بیان نموده اند که کودکان دارای سندرم داون نسبت به همسالان سالم خود در ۵ هارمونی اول خود، طیف قدرت متفاوتی داشتند و دارای فرکانس پایین و تعداد هامونیک ۹۹ درصد تا ۹۹/۵ درصد از کل قدرت بودند (۲۳)، مقدار محتوای فرکانس ۹۹/۵ درصد نیروهای عمودی عکس العمل زمین، متغیرهای زیادی را در بررسی عمکردی رفتار کودکان با سندرم داون محیا می کند (۲۳) که با پژوهش فوق همراستا بود. پژوهش فوق نیز گزارش نمود مقادیر فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد در گروه دارای آسیب ACL بعد از خستگی ۳۵/۷۶ درصد افزایش یافته بود که می تواند نشان دهنده این باشد که در این افراد با افزایش خستگی تعادل کاهش می یابد.

در مطالعات انجام شده گزارش شده است که کاهش فرکانس میانۀ را می توان با افزایش خستگی در ارتباط دانست و کاهش فرکانس میانۀ به تغییر تارهای نوع دو به نوع یک نسبت داده شده است که در آن انقباض آهسته تر و با نوسانات کمتر در عضله همراه می باشد (۲۱، ۲۴)، که با نتایج تحقیق فوق همراستا نبود. عدم همسو بودن احتمالاً می تواند بدلیل تفاوت در نوع انجام پروتکل باشد. استیرجیو و همکاران بیان نمودند زنان میانسال در مقایسه با زنان جوان در راستای قدامی-خلفی دارای مقادیر فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد بسیار بالاتری بودند (۲۵). بر این اساس تفاوت سنی با مقادیر طیف فرکانس در جهت-قدامی خلفی قابل بررسی است (۲۵). همچنین گزارش شده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر خستگی بر طیف فرکانس نیروی های عکس العمل زمین وارده بر پا هنگام ضربه آپ چاگی در تکواندو کاران سالم و دارای آسیب ACL بود. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که یافته ها نشان داد اثر عامل زمان مولفه فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد در راستای داخلی-خارجی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون کمتر بود. اثر عامل زمان در مولفه فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد در مولفه نیروی عمودی عکس العمل زمین در پس آزمون نسبت به پیش آزمون بیشتر بود. همچنین اثر عامل زمان مولفه هارمونی ضروری در راستای داخلی-خارجی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون کمتر بود. نتایج نشان داد اثر تعاملی زمان×گروه در مقادیر مؤلفه نیروی عمودی عکس العمل زمین طی پس آزمون گروه دارای آسیب ACL به اندازه ۳۵/۷۶ درصد بیشتر از پس آزمون گروه سالم بود. بعلاوه اثر تعاملی زمان×گروه در مقادیر مولفه فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد در گشتاور آزاد طی پس آزمون گروه دارای آسیب ACL به اندازه ۴۰/۴۶ درصد بیشتر از پس آزمون گروه سالم بود.

پایین بودن مقادیر فرکانسی ۹۹/۵ درصد مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین نوسان کمتر در حین حرکات انتقالی و تعادلی را موجب می شود (۲۰، ۲۲). کاهش نوسان می تواند گواه بر این باشد که فرد در انجام حرکت توانسته کنترل پاسچر بهتری داشته باشد. مطالعات گذشته حاکی از آن است که افزایش در مقدار فرکانس ۹۹/۵ درصد موجب

نتیجه گیری

بر اساس یافته‌های این پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که خستگی تأثیر معناداری بر ویژگی‌های فرکانسی نیروهای عکس‌العمل زمین در تکواندوکاران دارای آسیب ACL نسبت به همتایان سالم دارد. افزایش مقادیر فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد در مؤلفه نیروی عمودی و گشتاور آزاد، همراه با کاهش دامنه هارمونی‌های ضروری در راستای داخلی-خارجی، بیانگر کاهش کارایی سیستم عصبی-عضلانی در حفظ تعادل و کنترل پاسچر پس از خستگی است. این تغییرات می‌توانند به کاهش ثبات عملکردی و افت سرعت در اجرای مهارت آپ‌چاگی منجر شوند. همچنین، نتایج نشان داد که الگوی پاسخ فرکانسی در گروه دارای آسیب ACL پس از خستگی، نسبت به گروه سالم، ناپایداری بیشتری را منعکس می‌کند که احتمالاً ناشی از محدودیت در هماهنگی بین اجزای سیستم حرکتی و کاهش توانایی جبران نوسانات حرکتی است. به طور کلی، این یافته‌ها بر اهمیت توجه به مداخلات تمرینی و بازتوانی هدفمند برای بهبود مؤلفه‌های فرکانسی و ارتقای ثبات دینامیکی در ورزشکاران با سابقه آسیب ACL تأکید دارند.

سپاسگزاری

از همه کسانی که ما را در انجام هر چه بهتر این پژوهش یاری نمودند، سپاسگزاریم.

ملاحظات اخلاقی

نویسندگان این مقاله طبق پروتکل‌های اخلاقی مطالعات هلسینکی عمل نموده و اطلاعات آزمودنی‌ها شرکت‌کننده در این مطالعه به طور کاملاً ناشناس باقی می‌ماند و بعد از مطالعه نیز تمامی این اطلاعات محفوظ باقی خواهد ماند. همچنین تمامی شرکت‌کنندگان در این مطالعه فرم رضایت نامه شرکت در این مطالعه را پر کرده و تمامی مقاصد مطالعه برای شرکت‌کنندگان به طور کامل شرح داده شده است. پژوهش حاضر در کمیته اخلاق دانشگاه محقق اردبیلی با کد IR.UMA.REC.1402.086 مورد تایید قرار گرفت.

تعارض منافع

هیچگونه تعارض منافی در این پژوهش وجود ندارد.

است که کاهش سرعت در حرکات انتقالی مانند پیاده روی می‌تواند فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد را افزایش دهد (۲۵). بنابراین می‌تواند اینگونه گفت که افزایش در مقادیر فرکانس با توان ۹۹/۵ درصد در گروه دارای آسیب ACL با بعد از خستگی می‌تواند بدلیل کاهش در سرعت انجام حرکت آپ‌چاگی باشد.

یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که به طور کلی دامنه هارمونی‌های ضروری در راستای داخلی-خارجی در گروه دارای آسیب ACL بعد از خستگی کاهش یافته بود. سیگنال نیروی عکس‌العمل زمین با فرکانس‌های مختلف توسط گیرنده‌های مکانیکی در سطح پوست دریافت شده و به سیستم عصبی مرکزی انتقال می‌یابد و پاسخ به صورت فرکانس به پا منتقل می‌گردد. بنابراین، فرکانس نیروی عکس‌العمل زمین ممکن است تا حدودی نشان‌دهنده عملکرد مؤلفه نوسانی سیستم عصبی حرکتی باشد (۱۹). اگرچه پارامترهای فضایی-زمانی می‌تواند به طور کلی حرکت آپ‌چاگی را تشریح کند، از جهات دیگر ممکن است پارامترهای کاملی را در نظر نگیرند، زیرا فقط قادر به درک اثر (مثلاً اندازه) حرکت و نه علت (مثلاً نیرو) هستند (۲۶). استفاده از داده‌های نیروی عکس‌العمل زمین، Crowe و همکاران گزارش نمودند که تقارن پایدار در محدوده مرکز جرم بدن باید در نظر گرفته شود (۲۷). با استفاده از تجزیه و تحلیل دامنه زمان و فرکانس، Giakas تغییرات و تقارن اندازه‌گیری شده از نیروی عکس‌العمل زمین را طی راه رفتن در افراد سالم بررسی کردند (۲۸). این مطالعه راه رفتن انسان را به صورت متقارن بر اساس تحلیل هارونیک تأیید کرد. تجزیه و تحلیل فرکانس حرکاتی تعیین‌کننده دامنه فرکانس‌های مربوط به تمامی اجزای سیستم عصبی حرکتی، استخوان‌ها، عضلات، اعصاب و بافت همبند است و با یکدیگر برای تولید حرکت هماهنگی دارند (۱۹). پهنای باند پایین نشان‌دهنده این است که یک یا چند مورد، نوسان حرکت قدامی-خلفی را محدود می‌کند (۱۹). در پژوهش حاضر تفاوت معناداری در میانه و پهنای فرکانس بین گروه‌ها نشان داده نشد. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش فوق می‌توان نتیجه‌گیری کرد که خستگی می‌تواند کنترل تعادل افراد دارای آسیب ACL تحت تأثیر قرار دهد همچنین کاهش تعادل می‌تواند موجب کاهش سرعت حرکت آپ‌چاگی شود.

References

- Chen J, Lu SL, editors. Prevention and intervention of sports knee joint injury in adolescents. Proceedings of the 2017 International Conference on Manufacturing Construction and Energy Engineering (MCEE 2017); 2017.
- Tsai L-C, Yu B, Mercer VS, Gross MT. Comparison of different structural foot types for measures of standing postural control. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*. 2006;36(12):942-53.
- Altarriba-Bartes A, Drobnic F, Til L, Malliaropoulos N, Montoro JB, Iruiria A. Epidemiology of injuries in elite taekwondo athletes: two Olympic periods cross-sectional retrospective study. *BMJ open*. 2014;4(2):e004605.
- Radzak KN, Putnam AM, Tamura K, Hetzler RK, Stickley CD. Asymmetry between lower limbs during rested and fatigued state running gait in healthy individuals. *Gait & posture*. 2017;51:268-74.
- Nicol C, Komi P, Marconnet P. Fatigue effects of marathon running on neuromuscular performance: I. Changes in muscle force and stiffness characteristics. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*. 1991;1(1):10-7.
- Kang D-K, Kang S-J, Yu Y-J. A biomechanical analysis of 540 o dwihuryeochagi of taekwondo. *Korean Journal of Sport Biomechanics*. 2013;23(1):19-24.
- Derrick TR, Dereu D, Mclean SP. Impacts and kinematic adjustments during an exhaustive run. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. 2002;34(6):998-1002.
- Friel K, McLean N, Myers C, Caceres M. Ipsilateral hip abductor weakness after inversion ankle sprain. *Journal of athletic training*. 2006;41(1):74.
- Hammer W. Core Stability Relates to Distal Segments.
- Lee C-L, Huang C, editors. ROTATION MOVEMENT ANALYSIS IN TAEKWONDO POWER BREAKING MOVEMENT OF 360° JUMP BACK KICK. ISBS-Conference Proceedings Archive; 2013.
- Roostamkhani H, Mirzaei B, Lotfi N, Hadi H. EFFECT OF PLYOMETRIC TRAINING AND SUBSEQUENT DETRAINING ON CHANGES IN FORCE-VELOCITY RELATIONSHIP.
- Bizid R, Margnes E, François Y, Jully JL, Gonzalez G, Dupui P, et al. Effects of knee and ankle muscle fatigue on postural control in the unipedal stance. *European journal of applied physiology*. 2009;106:375-80.
- Harkins KM, Mattacola CG, Uhl TL, Malone TR, McCrory JL. Effects of 2 ankle fatigue models on the duration of postural stability dysfunction. *Journal of athletic training*. 2005;40(3):191.
- Jafarnezhadgero AA, Majlesi M, Azadian E. Gait ground reaction force characteristics in deaf and hearing children. *Gait & posture*. 2017;53:236-40.
- Borg G. Borg's perceived exertion and pain scales: *Human kinetics*; 1998.
- Medicine ACoS. ACSM's health-related physical fitness assessment manual: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
- Koblbauer IF, van Schooten KS, Verhagen EA, van Dieën JH. Kinematic changes during running-induced fatigue and relations with core endurance in novice runners. *Journal of science and medicine in sport*. 2014;17(4):419-24.
- Adams D, Logerstedt D, Hunter-Giordano A, Axe MJ, Snyder-Mackler L. Current concepts for anterior cruciate ligament reconstruction: a criterion-based rehabilitation progression. *Journal of orthopaedic & sports physical therapy*. 2012;42(7):601-14.
- McGrath D, Judkins TN, Pipinos II, Johanning JM, Myers SA. Peripheral arterial disease affects the frequency response of ground reaction forces during walking. *Clinical Biomechanics*. 2012;27(10):1058-63.
- Wurdeman SR, Huisinga JM, Filipi M, Stergiou N. Multiple sclerosis affects the frequency content in the vertical ground reaction forces during walking. *Clinical Biomechanics*. 2011;26(2):207-12.
- Schneider E, Chao E. Fourier analysis of ground reaction forces in normals and patients with knee joint disease. *Journal of biomechanics*. 1983;16(8):591-601.
- White LJ, Dressendorfer RH. Exercise and multiple sclerosis. *Sports medicine*. 2004;34(15):1077-100.
- Wu J, Beerse M, Ajisafe T. Frequency domain analysis of ground reaction force in preadolescents with and without Down syndrome. *Research in*

- developmental disabilities. 2014;35(6):1244-51.
24. White R, Agouris I, Fletcher E. Harmonic analysis of force platform data in normal and cerebral palsy gait. *Clinical Biomechanics*. 2005;20(5):508-16.
 25. Stergiou N, Giakas G, Byrne JE, Pomeroy V. Frequency domain characteristics of ground reaction forces during walking of young and elderly females. *Clinical biomechanics*. 2002;17(8):615-7.
 26. Vaughan CL, Davis BL, O'connor JC. Dynamics of human gait: Human Kinetics Publishers; 1992.
 27. Crowe A, Schiereck P, De Boer R, Keessen W. Characterization of human gait by means of body center of mass oscillations derived from ground reaction forces. *IEEE Transactions on biomedical engineering*. 1995;42(3):293-303.
 28. Giakas G, Baltzopoulos V. Time and frequency domain analysis of ground reaction forces during walking: an investigation of variability and symmetry. *Gait & Posture*. 1997;5(3):189-97.