



Emotional Distance, Mourning Experience in Survivors of Covid-19 Deceased

Esmail Heidaranlu^{1*}, Morteza Ramezani², Mohammad Mehdi Salaree³, Taleb Badri⁴,
Mohamad Toosi⁵

1-Ph.D. in Nursing, Nursing Faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2- MSN, Nursing Faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3- Ph.D. in Nursing, Nursing Faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4- Assistant Professor of Faculty of Medicine, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

5- BSN, Nursing Faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Corresponding Author: Esmail Heidaranlu, Ph.D. in Nursing, Nursing Faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Email: eheidaranlu@gmail.com

Received: 2022/10/12

Accepted: 2023/12/10

Abstract

Introduction: According to the results of many studies that people who experience incomplete and persistent Mourning are more exposed to mental and physical injuries, including depression and other mental disorders. The purpose of this study is to explain the experience of the families of those who died from covid-19.

Methods: The results of this research include 3 main categories (painful death, virtual mourning and strange burial) and 12 sub-categories: glass chamber, complicated and ambiguous death, aliens, minimal care, strange mourning, internet sympathy, online mourning, solitary mourning, Burial in homelessness, waiting eyes, emotional isolation and lack of social support

Results: The results of this research include 3 main categories of painful death, virtual mourning and strange burial and 12 subcategories of glass chamber, complicated and ambiguous death, aliens, minimal care, strange mourning, internet sympathy, online mourning, solitary mourning. Burial in exile, waiting eyes, emotional isolation and lack of social support.

Conclusions: Based on the findings of the current research and previous studies in this field, it can be expressed that Survivors of people who died due to Corona have reported adverse experiences from this phenomenon which this suppressed mourning and not receiving social support can have destructive effects on their psyche.

Key words: Covid-19, Experience, Survivors.



فاصله عاطفی، تجربه سوگ در بازماندگان متوفیان کووید ۱۹

اسماعیل حیدرانلو^{۱*}، مرتضی رمضانی^۲، محمد مهدی سالاری^۳، طالب بدرا^۴، محمد طوسی^۵

- ۱- دکترای پرستاری، گروه پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران.
- ۲- کارشناس ارشد پرستاری نظامی، گروه پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران.
- ۳- دکترای پرستاری، گروه پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران.
- ۴- متخخص روان پزشکی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.
- ۵- دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران.

نویسنده مسئول: اسماعیل حیدرانلو، دکترای پرستاری، گروه پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران.
ایمیل: eheidaranlu@gmail.com

پذیرش مقاله: ۱۴۰۲/۹/۱۹

دریافت مقاله: ۱۴۰۱/۷/۲۰

چکیده

مقدمه: با توجه به نتایج بسیاری از مطالعات مبنی بر اینکه افراد تجربه کننده سوگ ناتمام و پایدار، بیش از سایرین در معرض آسیبهای روانی و جسمی اعم از افسردگی و سایر اختلالات روان هستند. هدف مطالعه حاضر، تبیین تجربه خانواده‌های متوفیان کرونایی می‌باشد.

روش کار: در این مطالعه، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختارمند جمع آوری و فرآیند تجزیه و تحلیل داده‌ها به طور همزمان و با استفاده از روش گرانهیم و لاندمان انجام شد. جهت افزایش اعتبار و اعتماد علمی داده‌ها از معیارهای چهارگانه گوبا و لینکلن استفاده گردید. اطلاعات حاصل شده از مصاحبه‌ها وارد نرم افزار MAXQDA-20 گردید و تجزیه تحلیل داده‌ها انجام گرفت.

یافته‌ها: نتایج این پژوهش شامل ۳ طبقه اصلی (مرگ درد آور، سوگواری مجازی و خاکسپاری غریبانه) و ۱۲ زیر طبقه (اتاک شیشه‌ای، مرگ پیچیده و مبهم، آدم‌های فضایی، مراقبت حداقلی، عزاداری غریبانه، همدردی اینترنتی، عزاداری اینلاین، سوگواری انفرادی، دفن در غربت، چشمان منتظر، مطالعات قبلی انجام شده در این زمینه می‌توان بیان کرد که بوده است.

نتیجه گیری: براساس یافته‌های پژوهش حاضر و مطالعات قبلی انجام شده در این زمینه می‌توان بیان کرد که بازماندگان افراد فوت شده بعلت کرونا، تجارب نامطلوبی را از این پدیده گزارش نموده که این سوگ سرکوب شده و عدم دریافت حمایت اجتماعی، میتواند اثرات مخربی را بر روان آنها بر جای گذارد.

کلیدواژه‌ها: کووید-۱۹، تجربه، بازماندگان.

ناشناخته بودن بیماری و عدم وجود درمان قطعی برای مبتلایان، سبب ابتلاء حدود ۴۵۰ میلیون نفر و مرگ بالغ بر ۶ میلیون نفر از مبتلایان شد (۲). لذا می‌توان گفت که شیوع این ویروس تاکنون سبب سوگ و داغدیدگی بسیاری از افراد در سراسر دنیا شده است (۳).

علیرغم رایج بودن پدیده سوگ در زندگی بشر، فقدان عزیزان می‌تواند پدیده‌ای با پیامدهای مختلف در همه

مقدمه

پاندمی کووید ۱۹ در دسامبر ۲۰۲۰ از چین آغاز شده و به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت که تغییرات وسیعی را بر سبک زندگی افراد بوجود آورد. پتانسیل رشد این ویروس در جهان به یک بیماری فraigیر و تهدیدی جدی برای سلامت جامعه تبدیل شده WHO کووید ۱۹ را به عنوان یک تهدید «سطح بالا» شناسایی کرده است (۱).

و عدم بهره مندی از حمایت همدلانه و حضور موثر نزدیکان در کنار بازماندگان سوگوار، موجبات انزوا و تغییر تجربه افراد از مرگ عزیزان و فرآیند سوگواری ناتمام را فراهم می آورد (۱۱،۹). اهمیت برگزاری مراسم سوگ را از دو جهت می توان مورد بررسی قرار داد: نخست به این علت که تشریفات هر گروه فرهنگی سبب کاهش رنج ناشی از فقدان شده و در درجه دوم، در میان گذاشتن اندوه ناشی از سوگ سبب تسهیل فرآیند تطابق خواهد شد (۱۱).

با توجه به نتایج بسیاری از مطالعات مبنی بر اینکه افراد تجربه کننده سوگ ناتمام و پایدار، بیش از سایرین در معرض آسیبهای روانی و جسمی اعم از افسردگی، افکار خودکشی، اضطراب، PTSD، اختلالات خواب، بیماری قلبی، سرطان، یا فشار خون بالا، اختلال در عملکرد در روابط یا کار و سوءصرف سیگار، الکل و مواد مخدر بوده (۱۰) و با توجه به ذکر عوامل ایجاد کننده سوگ ناپایدار و تداوم این عوامل و ادامه دار بودن پاندمی کرونا، این احتمال وجود دارد که سوگ حل نشده پایدار، به یکی از چالش‌های بهداشت عمومی در حوزه سلامت روان تبدیل شود، در این صورت برای ارتقا کیفیت مراقبت‌های ارائه شده به افراد سوگوار و افزایش درک ما برای جلوگیری از آثار منفی این پدیده نیاز به اقدامات اثربخش و مبتتنی بر شواهد است (۱۲،۱۳).

روش کار

در این مطالعه، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختارمند جمع آوری و فرآیند تجزیه و تحلیل داده‌ها به طور همزمان و با استفاده از روش Graneheim و Lundman انجام شد (۱۴). معیارهای ورود شامل: بستگان درجه یک و با این تجربه بیمار مبتلا به کووید-۱۹ فوت شده، داشتن توانایی کلامی برای شرکت در مصاحبه و تمایل به داشتن همکاری و شرکت در این پژوهش بوده است.

روش نمونه‌گیری: از روش نمونه‌گیری هدفمند، با حداقل تنوع از نظر سن، جنس، سطح تحصیلات و تخصص استفاده شد.

حجم نمونه: مشارکت کنندگان ۲۰ نفر شامل ۵ زن و ۱۵ مرد بوده که مشخصات آنها در جدول ۱ نمایش داده شده است.

ایعاد فردی شناخته شود. بطور کلی علائم سوگ شامل دو گروه از علائم درمانگی جدایی و درمانگی تروماتیک می باشد که اولی بصورت اشتیاق بیش از حد برای جستجوی متوفی و دومی با علائم ناباوری، دشواری در پذیرش واقعیت و تلخ و دردناک بودن فقدان مشخص می شود (۴). اشکال مختلف سوگ به خودی خود اختلال به شمار نیامده و در حالت طبیعی، ۶ ماه پس از سوگ متعاقب مرگ، اکثر نشانه‌ها در فرد بازمانده رو به کاهش می رود (۵). لکن در صورت وجود مانع بر سر فرآیند طبیعی مقابله و حل و فصل سوگ، اختلال سوگ حل نشده پایدار بروز پیدا میکند که با علائم اصلی همراه با اختلال عملکرد بیش از ۶ ماه مشخص می شود (۶).

بنا به نظر فروید (۱۹۵۷)، علت مرگ (در اثر یک بیماری مزمم یا حاد) و رابطه بازمانده با فرد متوفی بر فرآیند سوگ تاثیر می گذاردند (۷). همچنین کارا ال و همکاران در مطالعه خود بیان می کنند که واکنش‌های مقابله‌ای رایج در فرآیند سوگواری اعم از انکار، احساس گناه، خشم و سرزنش خود و سایرین، در سوگ ناشی از بیماری همه گیر به میزان شدیدتری تجربه می شود بدین صورت که ادراک فرد از غمی که محتمل شده به چند برابر افزایش و سوگ ناتمام پایدار شدت یافته و آسیب‌های جسمی و روانی بسیاری بر فرد تحمیل می شود (۸). مرگ ناشی از ابتلاء کرونا نیز بعلت درد و رنج ناشی از ابتلاء به بیماری، پیشرفت سریع و مهار ناپذیر بیماری، عدم اطمینان در خصوص علت بیماری و عدم وجود درمان قطعی فرآیند سوگ بازماندگان را به سمت پیچیده و پایدار شدن سوق می دهد (۹). علاوه بر این، افراد خانواده در لحظات پایانی زندگی متوفی معمولاً در کنار وی حضور نداشته و امکان وداع از آنها سلب می شود. چنین مرگهایی، «مرگ بد» خوانده می شوند که سبب دو چندان شدن اندوه ناشی از فقدان در بازماندگان بعلت تجربه ازدواج اجتماعی، عدم حمایت اجتماعی و عاطفی، مشکلات مالی، نگرانی برای سلامتی خود یا سایر اعضای خانواده و عدم برگزاری مراسم معمول عزاداری می شود (۱۰).

با توجه به دستورات سازمان بهداشت جهانی مبنی بر انتقال فرد به فرد بیماری کرونا، لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، امکان برگزاری آئین‌های مرسوم سوگواری به حالت معمول وجود نداشته

کردن یافته ها با مشارکت کنندگان» استفاده گردید. به همین منظور پژوهشگران انطباق یافته ها با تجارت شرکت کنندگان را مورد بررسی قرار دادند. برای تحقق اطمینان پذیری کلیه مصاحبه ها ضبط و کلمه به کلمه نوشته شد. مراحل با دقت ثبت و داده ها نگهداری می شوند در نهایت هنگام نگارش گزارش تحقیق، گفته های مشارکت کنندگان به وفور مورد استناد قرار گرفت. به منظور تصدیق پذیری یا قابلیت تأیید، پژوهشگران کلیه مراحل تحقیق و تصمیمات اخذ شده در طول آن را به طور دقیق ثبت و گزارش نمودند تا در صورت نیاز امکان پیگیری و تکرار فرایند تحقیق برای دیگران فراهم آید. در نهایت به منظور تأمین قابلیت انتقال یافته ها، محققین سعی نمودند با توصیف دقیق مشارکت کنندگان، خصوصیات محیط پژوهش، روش نمونه گیری، زمان و مکان جمع آوری داده ها به طور کامل زمینه ی پژوهش را شرح دهند تا خواننده بتواند در مورد قابلیت انتقال داده ها (Transferability) قضاوتش باشد.

به منظور رعایت اصول اخلاق در پژوهش، پژوهشگر پس از کسب مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله که با کد ۱۳۹۹.۲۳۳ IR.BMSU.REC ثبت گردید، برای انجام مصاحبه ها اقدام نمود. قبل از هر مصاحبه، رضایت اگاهانه از شرکت کنندگان جهت ورود به مطالعه و ضبط مصاحبه، کسب شده و در رابطه با حفظ رازداری، رعایت امانت در نگهداری و ارائه درست اطلاعات کسب شده، بدون درج نام افراد تأکید گردید.

یافته ها

مشارکت کنندگان از اقوام نزدیک فرد متوفی بوده که دارای تجربه از دست دادن یک عضو از خانواده را به علت بیماری کووید-۱۹ داشته اند. در جدول ۱ ویژگیهای دموگرافیکی مشارکت کنندگان ارائه شده است. نتایج این پژوهش شامل ۳ طبقه اصلی و ۱۲ زیر طبقه بوده است که در جدول ۱ ارایه شده است.

جمع آوری داده ها: پس از توضیح اهداف مطالعه و اخذ رضایت آگاهانه، مصاحبه های نیمه ساختارمند، در ابتداء با سوالات بازپاسخ کلی مانند «درباره تجربه مرگ و از دست دادن عزیزانتان که به به بیماری کووید-۱۹ مبتلا بوده اند توضیح دهید؟ شروع گردید و سپس تمرکز سوالات به دنبال پاسخ های مشارکت کنندگان تغییر نمود. محیط پژوهش و زمان انجام مصاحبه ها به منظور راحتی مشارکت کنندگان با هماهنگی آنها تعیین گردید. تمامی مصاحبه ها ضبط و کلمه به کلمه پیاده سازی گردید.

تجزیه و تحلیل داده ها: در این پژوهش از روش گرانهیم و لاندمن، برای تحلیل محتواهای داده های کیفی استفاده شد به این منظور ابتدا فایل صوتی مصاحبه ها پیاده سازی شد و سپس با مطالعه ای دقیق آنها، محققین تلاش نمودند تا عناصر ظاهری و درونی آنها را دریافت نمایند. جملات و عبارات معنایی بدست آمده، خلاصه شده و کدگذاری گردید. در این بخش، هر کلمه و عبارت نوشته شده، عنوان واحد تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شد. مطالعه مجدد دست نوشته ها و یادداشت های تفسیری همزمان، به تشخیص ارتباطات اولیه میان مفاهیم استخراج شده از بیانات مشارکت کنندگان کمک نمود. یادداشت ها و کدها، به شکل گیری درون مایه ها کمک کرد و با پیشرفت مصاحبه ها و مشخص شدن ارتباط میان درون مایه ها، تشخیص الگوها و معانی اصلی درون مصاحبه ها امکان پذیر گردید. کدهای استخراج شده بر اساس شباهت ها و تفاوت ها در یک فرآیند مقایسه مدام در طبقات اولیه دسته بندی و در نهایت با مقایسه و بررسی عمیق طبقات اولیه، درون مایه های اصلی شکل گرفت.

جهت افزایش اعتبار و اعتماد علمی داده ها از معیارهای چهارگانه گوبا و لینکلن استفاده گردید (۱۵). پژوهشگران سعی نمودند تا با مشارکت کنندگان ارتباط مناسب برقرار کرده و با درگیری طولانی مدت و غوطه وری کامل در داده ها اعتبار داده ها را افزایش بخشنند. همچنین از «چک

جدول ۱

متغیر	میانگین انحراف معیار	تعداد (۲۰ نفر)	درصد (%)	سن
	۴۱±۱۸			
جنس				
زن	۵	۲۵	۷۵	۷۵
مرد	۱۵			
متاهل	۱۱	۵۵	۴۵	
مجرد	۹			
وضعیت تا هل				
تحصیلات				
مجرد	۹	۴۵		
دیپلم	۳	۱۵		
لیسانس	۱۵	۷۵		
دکترا	۲	۱۰		
نسبت با متوفی				
همسر	۶	۳۰		
فرزند	۱۲	۶۰		
نوہ	۲	۱۰		

طبقه اصلی	زیرطبقه
مرگ درد آور	اتاک شیشه‌ای مرگ پیچیده و مبهم آدم‌های فضایی مراقبت حداقلی
سوگواری مجازی	عزاداری غریبانه همدردی اینترنتی عزاداری انلاین سوگواری انفرادی
خاکسپاری غریبانه	خاکسپاری غریبانه دفن در غربت چشمان منتظر ازواج عاطفی عدم حمایت اجتماعی

مادرم را ببینم که کلی هم دستگاه بهش وصل هست و این اتفاق با دیوارهای شیشه‌ای که من و مادرم را از هم جدا کرده بود عذابم می‌داد (مشارکت کننده شماره ۱).

«خیلی سخته، خیلی، روز تشییع جنازه حتی نمی‌توانستیم مادرمون که حالش خیلی بد شد و دائم جیغ می‌زد، رو بغل کنیم، هی می‌افتاد زمین و به سختی بلند می‌شد اما چون ممکن بود ناقل باشه، می‌گفت نزدیک من نیاین. دور از هم ایستاده بودیم و گریه می‌کردیم. موقع خاکسپاری هم گفتن دور قبر جمع نشین و خودشون پدر رو در خاک گذاشتند. بعد هم از ما خواهش کردن که خیلی اونجا نمونیم، هیچ‌کس نبود که ما رو دلداری بده و خودمون هنفر هم جرأت نمی‌کردیم نزدیک هم بشیم(مشارکت کننده شماره ۱۷).

۲- سوگواری مجازی

۱- مرگ درد آور

طبق نظر مشارکت کننده‌ها هنگامی که بیمار مبتلا به کووید-۱۹ در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بوده است اجازه ملاقات به همراهان داده نمی‌شود و همراهان در جریان دقیق روند درمان نبوده اند و روند سیر درمانی برای آنها در برخی موارد گنگ بوده است. در زمانی هم که مرگ بیمار رخ می‌داد اجازه دیدار داده نمی‌شود و تمام مراحل انتقال و خاکسپاری توسط افرادی که لباس‌های مخصوص (مانند آدم‌های فضایی) به تن داشته‌انجام می‌شود که برای نزدیکان شخص متوفی بسیار سخت بوده است.

من می‌دانستم که مادرم ممکن هست هر لحظه بمیرد به همین دلیل دوست داشتم از نزدیک بینمش و برای یک بار هم که شده نازش کنم، خیلی بی تاب بودم ولی مادر در بخش ICU بستری بود و من مجبور بودم از پشت شیشه

شاهد این بودم که مادرم را داخل قبر بردن و متاسفانه هیچ کدام از خواهر یا برادرها نتوانستیم با مادر خداخفصی آخر را انجام دهیم (مشارکت کننده شماره ۲).

درست هست که پدرم بیماری کرونا داشت و از این بیماری فوت کرد ولی دوست داشتم دیگر بستگان مانند دایی و عموها نیز در مراسم خاکسپاری شرکت می کردند. چرا باید مراسم خاکسپاری پدرم اینقدر خلوت و در تنهايی و غربت باشه. یك نفر نبود که کنارمون باشه و به ما دلداری بده (مشارکت کننده شماره ۱۴).

بحث

نتایج مطالعه حاضر بیانگر تجربیات متفاوت اقوام درجه یک بیماران فوت شده بعلت کووید ۱۹ بود. براساس یافته های پژوهش حاضر^۳ طبقه اصلی شامل مرگ درد آور، سوگواری مجازی و خاکسپاری غریبانه بود.

دولت ها و سیستم بهداشت و درمان تمهداتی بمنظور دور نمودن بیمار فوت شده بعلت کووید ۱۹ اندیشیده اند که از جمله آن میتوان به محدودیت ملاقات بازماندگان و ایزوله نمودن آنها از فرد متوفی اشاره نمود که این مسئله بعلت تضاد با فرهنگ حاکم بر کشور ما برای بازماندگان چالشهایی را ایجاد نموده است. در سراسر دنیا نیز گزارش های گسترده ای در خصوص عدم دسترسی خانواده های قربانیان کووید ۱۹ به اجسام و محدودیت در ملاقات و خاکسپاری وجود دارد. از سویی علیرغم نیاز خانواده ها به بودن در کنار فرد متوفی، ماهیت انتقال سریع ویروس کرونا نیز موانعی را برای وداع با فرد از دست رفته ایجاد کرده است. براساس یافته های پژوهش حاضر، انجام مراحل انتقال و خاکسپاری متوفی توسط افراد با پوشش های ویژه و غیر معمول و عدم امکان ملاقات با عزیزان در زمان حیات و بستری در بیمارستان، بعنوان یکی از چالش های اصلی شرکت کننده گان مطرح شده است.

یکی از زیرطبقه های چالش مرگ درد آور، توسط شرکت کننده گان در پژوهش حاضر، مرگ پیچیده و مبهم عزیزان بود. نتایج مطالعات موجود مبنی برآن است که نگرانی عمده خانواده متوفیان ناشی از کرونا، ارائه اطلاعات کامل و صادقانه توسط تیم درمانی به آنها می باشد که اغلب این انتظار در آنها برآورده نشده باقی می ماند (۱۶، ۸). در مطالعه انجام شده توسط ایراندوست و همکاران بررسی نتایج نشان داد که وداع ناقص با جسد، غیرقابل باور بودن مرگ، ابهام و

طبق نظر مشارکت کننده ها بعد از مرگ عزیزانشان اجازه برگزاری مراسم سوگواری را نداشته اند و بسیاری از بستگان یا با تماس تلفنی و یا در فضای مجازی به بازماندگان تسلیت گفته اند. به نظر مشارکت کننده ها در برخی موارد حتی خواهر و برادر هم نتوانسته اند از نزدیک به سوگواری پپردازند و مجبور بوده اند در تنهايی خود عزاداری نمایند. ...حتی نتوانسته در خاکسپاری خواهersh هم شرکت کند «تdefin را خانواده کوچک خودشان برگزار کردن و هیچ کدام از ما خواهه را و برادرها نتوانستیم در آن شرکت کنیم. مراسم دیگری هم برگزار نشد، صرف اینترنی باهم در تماس بودیم و فقط یکبار خواهه دیگر ام در راه روی آپارتمان خانه ما و از فاصله دور از هم گریه کردیم. بچه هایش بی تابی می کنن و اینکه کاری از دست ما برای کمک به اونها بر نمیاد، آروم و قرار رو از ما گرفته. شرایط خیلی دشوار و توضیحش بسیار سخته. همه ما پشت درهای بسته باید به تنهايی بار تمام مشکلات و مصیبت پیش او مده رو به دوش بکشیم (مشارکت کننده شماره ۶).

مرد داغدار با دو دختر ۱۱ و ۸ ساله: حالا همه کار بچه ها شده گریه کردن با مادر بزرگ و خاله های شان از پشت تلفن همراه و عکس مادری که هر شب بغل می کنند. داغون شدیم، همه مون و هیچ کس هم نمی تونه کمک مون کنه. مراسم عزاداری دسته جمعی آدم رو از ترس و وحشت دور می کنه و این امکان الان نیست و معلوم هم نیست کی بتونم ببرم شون سر مزار مادرشون (مشارکت کننده شماره ۸).

۳- خاکسپاری غریبانه

طبق نظر مشارکت کننده ها خاکسپاری در محیطی کاملاً خلوت و با تعداد حداقلی اعضای خانواده برگزار گردید و در روز خاکسپاری فامیل های دیگر حضور نداشتند. به اعتقاد مشارکت کننده ها نبود سایر بستگان در زمان خاکسپاری بسیار سخت بود و تا آخرین لحظات خاکسپاری اعضای خانواده متوفی منتظر حضور بستگان خود بودند. مرگ بر اثر بیماری کووید ۱۹ باعث شده بود که خانواده متوفی تا مدتی در انزوای اجتماعی و عاطفی به سر برداشته شرایط روحی و روانی نزدیکان متوفی را تحت تاثیر قرار داده است. به علت خطر گسترش ویروس، اجازه برگزاری مراسم خاکسپاری معمول به ما داده نشد، اعضای خانواده فرستی پیدا نکردند تا از عزیزان خداخافظی کنند، خیلی دوست داشتم یک بار دیگر صورت مادرم را می دیدم ولی تنها

آمدن مشکلاتی اعم از غم و اندوه حل نشده و باقیمانده در بازماندگان افراد فوت شده بعلت کرونا می شود^(۹). به منظور درک بهتر نقش برگزاری آیین های سوگواری در تسلی خاطر بازماندگان میتوان به سه مرحله طبیعی سوگ که توسط Romanoff and Terenzio (۱۹۹۸) بیان شده است اشاره نمود مرحله اول سوگ نرمال در درون فرد و حوزه روانی رخ میدهد که دگرگونی نام میگیرد، مرحله دوم بعنوان دوره گذار شناخته شده و در حوزه روانی اجتماعی بروز پیدا میکند که مکمل مرحله اول می باشد. مرحله سوم که اتصال نامیده میشود نیز در بستر جامعه رخ داده و نتیجه آن یک پیوند درونی با متوفی می باشد^(۲۰). در پژوهش انجام شده توسط حمید و همکاران که بمنظور بررسی کیفی فرآیند سوگ انجام شده است، نتایج بیانگر آن است که سوگواری برای از دست رفتن، چالشی مهم برای مسلمانان کشمیر بوده چرا که اغلب امکان حضور فیزیکی نزدیکان فراهم نبوده که این مسئله موجبات انزوا نزدیکان فرد متوفی را فراهم می آورد علاوه بر این ناتوانی در اجرای آخرین مناسک خاکسپاری، سبب اضافه شدن اندوهی جدید به سوگ موجود در فرد شده که بر سطح رفاه آها تاثیرگذار خواهد بود^(۲۱).

سایر یافته ها در این زمینه نیز حاکی از آن است که در طول پاندمی کرونا، حضور در مراسم تشییع جنازه شرایط بهتری را برای هر گروه سنی چهت پذیرش و تطابق آسانتر با سوگ ایجاد شده فراهم کرده و حضور فیزیکی حامیان در مراسم خاکسپاری نوعی حس دریافت حمایت اجتماعی را به بازماندگان منتقل می نماید^(۹). لذا چالش های پیش روی برگزاری مراسم خاکسپاری و تشییع جنازه سبب پیچیده شدن فرآیند سوگ شده^(۸) که خود بعنوان یکی از دغدغه های اصلی سلامت عمومی در نظر گرفته می شود^(۲۲).

نتیجه گیری

پس از پاندمی کرونا تغییرات وسیعی در فرآیند تجربه سوگ افراد ایجاد شده که بعلت منحصر بفرد بودن تجارت افراد از سوگ، درک آنها از فقدان عزیزان بعلت کرونا متفاوت بوده و هر شخص به جنبه خاصی از فقدان ناشی از فوت عزیز، توجه دارد. که این تغییرات علاوه بر مصائب مذکور، قادر به ایجاد اثرات مطلوبی اعم از کاهش هزینه ها و پرزنگ تر شدن جنبه های معنوی سوگواری نیز میباشد. لکن بطور

تنش در روند تدفین، نگرانی از نگذاشتن احترام به متوفی و رها شدن وی از چالش های پیش روی خانواده های داغدار در دوران کرونا بود^(۱۷)، که این یافته با اظهارات شرکت کنندگان در پژوهش حاضر که بیان کننده دفن متوفی با افرادی شبیه «آدم فضایی» و ایزوله نمودن فرد متوفی در زمان حیات در «اتفاق شیشه ای» است، همسو می باشد. رابرт و همکاران نیز در مطالعه خود بیان نمودند که در خانواده های دارای افراد مبتلا به کرونا، دشواری در مدیریت بیماران به تنهایی بعلت محدودیت های موجود از سمت جامعه و افراد مشاهده می شود همچنین محدودیت های اعمال شده توسط بیمارستانها و مراکز درمانی نیز بار روانی سنگینی را بر دوش خانواده تحمیل می کند^(۱۸).

سوگواری محازی نیز از طبقات اصلی مطالعه حاضر بود. که بنا به گفته بازماندگان امکان برگزاری مراسم سوگواری بعلت ممنوعیت آرامستانها و یا ترس از ابتلا بازماندگان برگزار نشده است و بعضا حتی نزدیکان درجه یک بیمار اعم از خواهر و برادر نیز امکان سوگواری حضوری و رفتن بر سر مزار عزیزان خود را نداشته اند. بطور کلی از ابتدای شیوع پاندمی کرونا، درسراسر دنیا نیز این چالش وجود داشته و صرفا در بازه های زمانی کوتاه و با فاصله از فرد متوفی، امکان برگزاری مراسم سوگواری وجود دارد و بخش عمده این آیین ها که برای تطابق بهتر بازماندگان با فرآیند سوگ، لازم است، بصورت ارسال پیام تسلیت از طریق شبکه های محازی و پیام رسانهای داخلی و خارجی، قرار دادن تصویر فرد متوفی در پروفایل و تشکیل گروه هایی بمنظور قرائت متون مذهبی و آیین های موجود در دین اسلام صورت می گیرد^(۱۹). علیرغم متدالوی بودن تسلیت گفتن بصورت محازی پیش از پاندمی کرونا، آنچه حائز اهمیت است میزان التیام یافتن درد و رنج بازماندگان با اجرای مراسم سوگواری «صرفا بصورت اینترنتی» می باشد. در مطالعه صورت گرفته توسط بهار وجبارپور در ایران، یافته ها بیانگر آن بود که سوگواری از طریق شبکه های محازی علیرغم اینکه توانایی غلبه نسبی بر کمبود ناشی از حضور فیزیکی را دارند اما همچنان موجب طی شدن مراحل سوگ به روش نرمال و ایجاد آرامش روانی بازماندگان نمی شوند^(۱۹). همچنین مرتضوی و همکاران نیز بیان نمودند که عدم امکان برگزاری مراسم سوگواری و در نتیجه عدم دریافت حمایت اجتماعی مورد نیاز در دوران سوگ، سبب طولانی شدن روند طبیعی سوگواری و بوجود

بررسی جنبه های مثبت و مزایای تشییع جنازه و خاکسپاری در دوران کرونا اشاره نمود.

عملادستیابی به افراد درجه یک و مراقبین متوفی با توجه به شرایط کووید در بخش های بستری با خطر بالایی برای محققان همراه بود بعلاوه مراقبین با توجه به حالات روحی خاص شان که متأثر از فوت بستگان شان بود بسختی حاضر به مصاحبه می شدند.

سپاسگزاری

بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تمامی شرکت کنندگان در این پژوهش، اعلام می نماییم.

تعارض منافع

در نگارش این مقاله برای نویسنندگان هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.

References

1. Sohrabi C, Alsafi Z, O'Neill N, Khan M, Kerwan A, Al-Jabir A, et al. World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19). *Int J Surg.* 2020;76:71-6. <https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034>
2. Organization Wh. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard 2022 [Available from: <https://covid19.who.int/>.]
3. Bertuccio RF, Runion MC. Considering grief in mental health outcomes of COVID-19. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy.* 2020;12(S1):S87. <https://doi.org/10.1037/tra0000723>
4. Mousavi ss, zargar y, davodi i, naami a. The Effectiveness of complicated grief treatment on symptoms of complicated grief: A single case research. *Journal of counseling research.* 2016;15(58):135-55.
5. Rosner R, Pföh G, Kotoučová M. Treatment of complicated grief. *European Journal of Psychotraumatology.* 2011;2(1):7995. <https://doi.org/10.3402/ejpt.v2i0.7995>
6. Vahia VN. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5: A quick glance. *Indian journal of psychiatry.* 2013;55(3):220. <https://doi.org/10.4103/0019-5545.117131>
7. Freud S. Mourning and melancholia. Standard edition. 1917;14(239):1957-61.
8. Wallace CL, Wladkowski SP, Gibson A, White P. Grief during the COVID-19 pandemic: considerations for palliative care providers. *Journal of pain and symptom management.* 2020;60(1):e70-e6. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsympman.2020.04.012>
9. Mortazavi SS, Shahbazi N, Taban M, Alimohammadi A, Shati M. Mourning during corona: A phenomenological study of grief experience among close relatives during COVID-19 pandemics. *OMEGA-Journal of Death and Dying.* 2021;00302228211032736. <https://doi.org/10.1177/00302228211032736>
10. Carr D, Boerner K, Moorman S. Bereavement in the Time of Coronavirus: Unprecedented Challenges Demand Novel Interventions. *Journal of Aging & Social Policy.* 2020;32(4-5):425-31. <https://doi.org/10.1080/08959420.2020.1764320>
11. Validabady Z. Letter to the editor Unfinished grieves of COVID-19. *Shenakht journal of psychology & psychiatry.* 2021;7(6):80-4. <https://doi.org/10.52547/shenakht.7.6.80>
12. Cox BE, Dean JG, Kowalski R. Hidden trauma, quiet drama: The prominence and consequence of complicated grief among college students. *Journal of College Student Development.* 2015;56(3):280-5. <https://doi.org/10.1353/csd.2015.0030>
13. Van der Houwen K, Stroebe M, Schut H, Stroebe W, Bout Jvd. Mediating processes in bereavement:

کلی براساس یافته های پژوهش حاضر و مطالعات قبلی انجام شده در این زمینه میتوان بیان کرد که بازماندگان افراد فوت شده بعلت کرونا، تجارب نامطلوبی را از این پدیده گزارش نموده که این سوگ سرکوب شده و عدم دریافت حمایت اجتماعی، میتواند اثرات مخربی را بر روان آنها بر جای گذارد.

کاربرد یافته ها

بمنظور تطابق موثرتر با فرآیند سوگواری تغییر یافته در دوران کرونا، ضروری است که در ابتدا تجارب بازماندگانی که عزیزان خود را در دوران پاندمی کرونا و بعلت ابتلاء به این بیماری از دست داده اند مورد بررسی قرار گرفته و در درجات بعدی طراحی مداخلات به منظور تسهیل تطابق با سوگ و ارائه حمایت اجتماعی از این افراد صورت گیرد.

حدود دیتها

از جمله محدودیت های پژوهش حاضر می توان به عدم

اسماعیل حیدرانلو و همکاران

- The role of rumination, threatening grief interpretations, and deliberate grief avoidance. Social Science & Medicine. 2010;71(9):1669-76. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.06.047>
14. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today. 2004;24(2):105-12. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001>
15. Guba EGJE. Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. 1981;29(2):75-91. <https://doi.org/10.1007/BF02766777>
16. Halpern J. Working with families facing undesired outcomes during the COVID-19 crisis. Available from SWHPN website at <https://swhpn.memberclicks.net/assets/01%20Working%20With%20Families%20Undesired%20Outcomes%20COVID19.pdf> Accessed March. 2020;29.
17. Yoosefi Lebni J, Irandoost SF, Safari H, Xosravi T, Ahmadi S, Soofizad G, et al. Lived Experiences and Challenges of the Families of COVID-19 Victims: A Qualitative Phenomenological Study in Tehran, Iran. INQUIRY: The Journal of Health Care Philosophy. 2022;59:00469580221081405. <https://doi.org/10.1177/00469580221081405>
18. Robert R, Kentish-Barnes N, Boyer A, Laurent A, Azoulay E, Reignier J. Ethical dilemmas due to the Covid-19 pandemic. Annals of intensive care. 2020;10(1):1-9. <https://doi.org/10.1186/s13613-020-00702-7>
19. Bahar M, Jabarpour F. Changes in the mourning rituals of the deceased after the corona And assess its effects on mourners. Religion & Communication. 2021;28(59):90-67.
20. Romanoff BD. Rituals and the grieving process. Death studies. 1998;22(8):697-711. <https://doi.org/10.1080/074811898201227>
21. Hamid W, Jahangir MS. Dying, Death and Mourning amid COVID-19 Pandemic in Kashmir: A Qualitative Study. OMEGA - Journal of Death and Dying. 2020;0(0):0030222820953708.
22. Gesi C, Carmassi C, Cerveri G, Carpita B, Cremona IM, Dell'Osso L. Complicated grief: what to expect after the coronavirus pandemic. Frontiers in psychiatry. 2020;11:489. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00489>