



پژوهش توانبخشی در پرستاری

دوره اول شماره ۱۳۹۳ پاییز

بررسی تأثیر تحریکات چند حسی بر بهره حافظه سالم‌مندان ساکن خانه‌های سالم‌مندان شهر اهواز.....۱	ایمان مقدسی فر، لیلا فخارزاده، مالک فریدونی مقدم، محمدحسین حقیقی زاده
تأثیر گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.....۱۲	جاسم بهرامیان، کیانوش زهرآکار، محسن رسولی
کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین اصلی عضو خانواده‌های کودکان مبتلا به معلولیت جسمی- حرکتی تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر ایلام.....۲۳	الهام حسینی، سیده فاطمه حق دوست اسکویی، صدیقه خنجری، محمد حیدری، منصوره قدوسی
مقایسه هوش هیجانی نابینایان و کمبینایان با افراد سالم در مؤسسه بهزیستی شهرستان شهرود سال ۱۳۹۲.....۳۲	محسن دهقانی، منیر نظری
بررسی اثربخشی یک دوره تمرین هوایی بر خودپنداوه بدنی و عزت نفس پرستاران.....۴۲	سید رضا سعادت مهر، کیان نوروزی، ندا خالدی، فرشته بخشیان، پوریا رضا سلطانی
تأثیر مراقبت معنوی- مذهبی بر اضطراب بیماران پس از عمل جراحی با پس عروق کرونر قلب.....۵۱	فرشته تاج‌بخش، محمدعلی حسینی، محسن صادقی قهروندی، مسعود فلاحتی خشکناب، اصغر رکوفیان، مهدی رهگذر
مقایسه موائع و تسهیل کننده‌های شرکت در برنامه بازتوانی قلبی از دیدگاه بیماران جراحی شده پیوند عروق کرونر و کارشناسان توانبخشی قلبی.....۶۲	زینب حاج علی‌اکبری، محمد علی حسینی، کیان نوروزی، مهدی رهگذر
نیازهای توانبخشی بیماران با ناتوانی جسمی ناشی از حادث ترافیکی برای بازگشت به جامعه: یک مطالعه کیفی...۷۴	فاطمه پاشایی ثابت، کیان نوروزی تبریزی، حمیدرضا خانکه، مسعود فلاحتی خشکناب

به نام خداوند جان و خرد

نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری

فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن علمی پرستاری ایران

دوره اول، شماره ۱ - پاییز ۱۳۹۳

صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران

مدیر مسؤول: دکتر کیان نوروزی

سردبیر: دکتر مسعود فلاحتی خشکناب

مدیر اجرایی: خانم زهرا تمیزی

کارشناس نشریه: خانم اکرم پوروی

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۳۲۹۶۱/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

- دکتر نرگس ارسلانی، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر فاطمه الحانی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

- دکتر اصغر دالوندی، استادیار پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر ناهید رژه، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهد

- دکتر مریم روانی پور دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

- دکتر عباس عبادی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

- دکتر مسعود فلاحتی خشکناب، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر سادات سیدباقر مذاج، استادیار آموزش پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر فرحتاز محمدی، دانشیار پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر سهیل نجفی، استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

- دکتر منیر نویها، دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان

- دکتر کیان نوروزی تبریزی، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر علیرضانیکیخت نصرآبادی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکتر مجیده هروی کریمی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهد

- دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حروفچینی و صفحه آرایی: مهندس صادق توکلی

طرح جلد: مهندس صادق توکلی

ناشر: انجمن علمی پرستاری ایران

نشانی: تهران میدان توحید-دانشکده پرستاری و مامایی تهران

کدپستی: ۱۴۱۹۷۳۲۱۷۱ صندوق پستی: ۱۴۱۹۵/۳۹۸ تلفن و نامبر: ۶۶۰۹۲۵۳۵

E-mail: info@ijrn.ir, Website: http://ijrn.ir

نیازهای توانبخشی بیماران با ناتوانی جسمی ناشی از حوادث ترافیکی برای بازگشت به

جامعه: یک مطالعه کیفی

فاطمه پاشایی ثابت^۱، کیان نوروزی تبریزی^۲، حمیدرضا خانکه^۳، مسعود فلاحی خشکناب^۴

چکیده

مقدمه: افزایش روزافزون حوادت و سوانح ترافیکی منجر به افزایش مصدومین و معلولین گردیده که بدرجات مختلفی دارای انواع محدودیتها و معلولیتهای جسمی هستند، خوبخانه پیشرفت‌های روز افزون علوم پزشکی، پرستاری و توانبخشی منجر گردیده بیشتر افراد با ناتوانیهای جسمی، توان بازگشت به جامعه را بدست آورند، برای بازگشت به جامعه باید نیازهای افراد ناتوان بخوبی شناخته شود تا با رفع آنها زمینه حضور در جامعه برای آنها فراهم گردد. هدف از این مقاله بررسی و درک نیازهای توانبخشی بیماران با ناتوانی جسمی ناشی از حوادث ترافیکی برای بازگشت به جامعه است.

روش پژوهش: این مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی و با روش تحلیل محتوا کیفی انجام گردید، ۱۲ مشارکت کننده از هر دو جنس با دامنه سنی ۱۸ تا ۴۵ ساله با سابقه حداقل ۳ ماه ناتوانی جسمی اندام فوقانی، تحتانی، و یا صدمات طناب نخاعی با روش نمونه گیری هدفمند از دو مرکز تخصصی بیمارستانی و کلینیکهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختارمند جمع آوری و تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. تجزیه و تحلیل داده‌ها به طور مستمر و همزمان با جمع آوری داده‌ها و به صورت مقایسه ایی با رویکرد تجزیه و تحلیل محتوا قراردادی انجام گردید.

یافته‌ها: بر اساس یافته‌های این مطالعه سه طبقه اصلی این مطالعه شامل نیازهای قرار گیری در چتر حمایتی، نیاز به تداوم مراقبتی، و نیل به استقلال مشخص گردید. در حقیقت نیازهای این مددجویان مورد حمایت قرار گرفتن از سوی دیگران شامل خانواده و جامعه، استمرار مراقبتها در سراسر دوران معلولیت و نیاز به استقلال بوده است.

نتیجه گیری: نیازهای شناخته شده در این تحقیق باید در طراحی برنامه‌های مراقبتی مددجویان گنجانده شود. لذا پیشنهاد می‌گردد، برای دستیابی ناتوانان جسمی ناشی از سوانح ترافیکی به استقلال، فراهم نمودن حمایت کافی آنها و همچنین در دسترس قراردادن و تداوم مراقبتها برای آنها، از رویکرد توانبخشی خانواده و جامعه محور با مدل توانبخشی چند بعدی فرآگیر که می‌تواند هر سه دسته نیاز فوق تامین نموده و پوشش دهد، استفاده گردد.

کلید واژه‌ها: سوانح، ناتوانی جسمی، حوادث ترافیکی، نیاز مراقبتی، مطالعه کیفی، توانبخشی، پرستاری.

۱- دانشجویی دکتراپی در پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.
۲- استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران. (نویسنده مسئول)

پست الکترونیکی: dr.kian_nourozi@yahoo.com

۳- دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

۴- دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

پرستاری، پزشکی، فیزیوتراپی، کاردیمانی، گفتار درمانی، حمایت روانی و خدمات مددکاری اجتماعی از همان زمان بستری در بیمارستان تا پس از ترجیح می شود (۹). همچنین، اثرات بلند مدت مصدومیت جسمی در زندگی اشخاص، عوارضی همچون تأخیر در بازگشت به زندگی اجتماعی و حرفة ای بعلت محدودیتهای عملکردی وسیع در ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی گزارش می شود (۱۱) و بالاخره با وجود پیشرفتهای اخیر مبنی بر امکان برگشت موققیت آمیز مصدومین جسمی به جامعه، آنان ممکن است در برگشت خود به زندگی اجتماعی خود با مشکلات و نیازهای متعددی مواجه شوند و با وجود تأکید اخیر محققین بر برگشت به جامعه ممکن است پیامدهای زیادی همچون عوارض اقتصادی و اجتماعی در مسیر بازگشت بر شخص عارض گردد و بازگشت به جامعه که هدف نهایی ناتوانی می باشد را با مسائلی روبرو سازد (۱۲، ۱۳). بعضی مطالعات نیز گزارش می کنند عدم ثبات عاطفی، ناسازگارهای اجتماعی ممکن است تطبیق فرد با زندگی و جامعه را با مشکلات و نیازهایی مواجه سازد (۱۵، ۱۴). باچر و راستون نیز بیان میکنند که برگشت به جامعه و بهبودی در بیماران با ناتوانی جسمی به نیازهای بیمارستگی داشته و پرستاران برای ارائه مراقبت توانبخشی مبتنی بر جامعه مناسب به بیمار صدمه دیده، نیاز به درک نیازهای جسمی روانی اجتماعی و شخصی او دارند (۱۶) از آنجا که نیازهای بازگشت به جامعه در بیماران با ناتوانی جسمی ناشی از تصادفات هنوز در پرده ابهام بوده و مطالعات انجام در ایران تنها در زمینه آمار و ارقام مصدومیت و ناتوانی جسمی ناشی از حوادث ترافیکی بوده و از سویی دیگر هیچ مطالعه ای با متداول‌تری کیفی در این زمینه در ایران وجود ندارد بنابراین، لزوم درک تجربه واقعی نیازهای توانبخشی در بیماران با ناتوانی جسمی ناشی از حوادث ترافیکی منجر به برنامه ریزی بهتر برای بهبود مراقبت از آنان خواهد شد. لذا، این مقاله با هدف درک و کشف نیازهای توانبخشی بیماران با ناتوانی جسمی ناشی از حوادث ترافیکی برای بازگشت به جامعه نگارش گردید.

مقدمه

سوابح در حال حاضر به عنوان یکی از مهم ترین و شایعترین تهدیدها به رسمیت شناخته شده است. بررسی داده ها از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۵ از بانک اطلاعات ملی تروما نشان داد که اکثریت صدمات غیر عمده، با بیشترین درصد (۴۱/۳) درصد) مربوط به حوادث ترافیکی است (۱) در آمریکا سالانه ۵۰۰ هزار نفر بر اثر ترومahuای ناشی از وسایل نقلیه جان خود را از دست داده اند و حوادث ترافیکی خودرو سومین علت مرگ و میر در این کشور است. در ایران از ۴ میلیون نفر بستری سالیانه در سال ۱۳۸۰، ۱/۵ میلیون نفر مربوط به ترومahuای است و روزانه ۳۳ نفر بر اثر ترومahuای رانندگی جان خود را از دست می دهند (۲). ترومای ناشی از حوادث رانندگی، علاوه بر مرگ و میر، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی و اجتماعی زیادی را از قبیل هزینه درمان، هزینه ازدستدادن درآمد خانواده در طول دوران بستری، هزینه و زمان صرف شده برای آموزش حرfe جدید به بیمارانی که بر اثر ترومای قادر به انجام حرfe قبلی خود نیستند و همچنین، کاهش بهرهوری جامعه، توقف فعالیت ها و مدیریت سازمان های تحت مسئولیت بیماران ترومایی یا فوت شده به جامعه تحمیل می کند (۳، ۴، ۵، ۶). همچنین، بیماران با صدمات تروماتیک ممکن است تجربه ناتوانی، درد مزمن، و تغییر دائم در کیفیت زندگی را تجربه کنند (۷). راسل Russel (۲۰۰۸) نیز، بیان میکند که بیماران با ناتوانی جسمی در بازگشت به زندگی نرمال با مشکلات جسمی و روانی متعددی مواجه می شوند که در مقابله با این موانع، تعدادی از مکانیسم ها مانند استراتژیهای سازگاری در کاهش استرس، ارتقاء عملکرد خانوادگی، افزایش کیفیت زندگی و استقلال بیماران نقش زیادی داشته و عدم بکارگیری و تقویت این استراتژیها و تواناییها در این بیماران ممکن است باعث افت کیفیت زندگی آنان گردد (۸). همچنین محدودیت های عملکردی بعلت مشکلات فیزیکی و پیامدهای اقتصادی ناشی از توانبخشی به علت از کار افتادگی موقت و دائم ناشی از آن ممکن است باعث اختلال کیفیت زندگی در مصدومین و خانواده های آنان شود (۹، ۱۰) که باعث نیاز به خدمات

اصحابه ها بین ۲۵-۴۵ دقیقه بسته به میزان توانایی بیمار برای ادامه مصاحبه متفاوت بوده است. مصاحبه ها بر روی ضبط صوت ثبت و پس از هر جلسه به صورت کلمه به کلمه پیاده شده اند. سوالات اصلی مصاحبه شامل این سوالات بوده است: از ماجراي تصادفون برام بگين؟ ميشه بگين بعد از حادثه چه اتفاقی افتاد؟ چه وضعیتی داشتید؟ تا چه حد می توانستید کارهایتان را خودتان بکنید؟ علاوه بر این از سوالات کاوشگرانه نیز به منظور روشن شدن پاسخ های شرکت کنندگان در جریان مصاحبه استفاده شده است. روش پژوهش بدین شکل بود که پس از انتخاب مشارکت کنندگان هدف و روش مطالعه برای بیماران شرکت کننده در مطالعه توضیح داده می شد و در صورتی که موافقت می کردند که در تحقیق وارد شوند رضایت نامه تحقیق برایشان قرائت و پاسخ سوالات انها داده می شد و ذکر می گردید که بیماران می توانند در هر زمانی که تمایل داشته باشند هیچ گونه جریمه و ضرر و زیان از شرکت در مطالعه انصراف دهند. از آن ها برای ضبط مصاحبه اجازه گرفته شد و به بیماران شرکت کننده در مطالعه اطمینان داده شد که اطلاعات آنان ها محترمانه خواهد ماند، و در نهایت بیماران فرم رضایت نامه کتبی را امضا می نمودند و در مرحله بعدی قرار ملاقات جهت مصاحبه تنظیم و هماهنگ می شد مصاحبه ها در محلی که مورد تمایل بیمار بود از جمله کلینیک، بیمارستان، منزل انجام گردید. سپس تمام مصاحبه با موافقت مشارکت کنندگان با دستگاه ضبط دیجیتال ضبط و طی ۲۴ ساعت کلمه به کلمه در نرم افزار word نسخه نویسی گردید سپس متن تایپ شده چندین بار مرور، کدگذاری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل اطلاعات از رویکرد آنالیز محتوى قراردادی استفاده شد. تحلیل محتوا به مثابه تکنیکی پژوهشی شامل شیوه های تخصصی در پردازش داده های علمی است. متن حاصل از مصاحبه ها به واحدهای معنایی که خلاصه سازی (Condense) شده بودند تقسیم شدند. واحدهای معنایی خلاصه شده انتزاعی و به وسیله کدها برچسب گذاری شدند. در ادامه کدها بر اساس مقایسه از نظر شباهت ها و تفاوت ها به زیر تم و تم ها مرتب شدند (۱۸). برای اطمینان از صحت و

روش مطالعه

این مطالعه بروش کیفی و با رویکرد تجزیه و تحلیل محتوى با هدف درک و کشف نیازهای مراقبت توانبخشی بیماران با ناتوانی جسمی ناشی از حوادث ترافیکی انجام شد. تحلیل محتوى قراردادی نیز به عنوان، یکی از روشهای تجزیه و تحلیل داده ها در این مطالعه کیفی مورد استفاده قرار گرفت (۱۷). مشارکت کنندگان در این پژوهش از بیماران بستری در دو بیمارستان تخصصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران و کلینیک های بازنوی وابسته به این دانشگاهها، به روش نمونه گیری هدفمند گرینش شدند. این دو مرکز از مراکز ارجاعی عمده و مهم برای درمان و توانبخشی مصدومین ترافیکی از سراسر ایران می باشند. معیارهای ورود مشارکت کنندگان به مطالعه شامل کلیه مصدومین ترافیکی آسیب دیده با تجربه تصادف با وسیله نقلیه موتوری، دارای معلولیت و یا آمبوتابسیون اندام فوقانی و تحتانی و یا ضایعه نخاعی با توانایی درک و صحبت با زبان فارسی و تمایل به شرکت در مطالعه بود، مشارکت کنندگان از محدوده سنی بین ۱۸ سال تا ۴۵ سال و از هر دو جنس زن و مرد، و با شدت آسیب بالای ۱۶ Injury Severity Score () گذشت حداقل ۳ ماه از حادثه ترافیکی انتخاب شدند. شرکت کنندگان با آسیب سر و یا بیماران با مشکلات شناختی و روانی از مطالعه حذف شدند. مشارکت کنندگان با استناد به دفتر پذیرش و ثبت بیماران در بخش آی سی بو، ارتوپدی و اعصاب در دو بیمارستان تخصصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و کلینیک های وابسته به این مراکز و منزل بیماران، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاری به صورت فردی و چهره به چهره انجام شده است. مصاحبه به روش نیمه ساختارمند و با یک سوال باز بر اساس سوال اصلی پژوهش آغاز می شد و بتدریج بر اساس تحلیل داده ها، سوالات ژرف کاو و پی گیر در خصوص نیازهای مراقبت توانبخشی در برگشت به جامعه در بیماران با ناتوانی جسمی ناشی از حوادث ترافیکی، پیش رفت. جمع آوری داده ها حدود ۹ ماه به طول انجامیده است. مدت

برای دیگران فراهم شود. جهت انتقال پذیری یافته ها سعی شد، نقل قول های مشارکت کنندگان به همان صورتی که گفته شده، ارایه گردد. در ضمن این مقاله قسمتی از یافته های تز دکتری است که توسط کمیته اخلاق شورای پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تصویب شده و اجازه نامه کتبی از کمیته اخلاق دانشگاه در خرداد ماه ۹۲ جهت نمونه گیری اخذ گردید.

یافته ها

مشارکت کنندگان شامل ۱۲ نفر بوند که شامل ، ۹ مود (۷۵ درصد) و ۳ زن (۲۵ درصد) بودند. متوسط سن بیماران ۳۰ سال بود. جوانترین بیمار ۲۰ سال و مسن ترین آنها ۴۵ سال داشت. مشخصات دموگرافیک مشارکت کنندگان بشرح ذیل بوده است (جدول ۱).

پایابی داده های کیفی از معیارهای دقت علمی مانند اعتبار credibility، قابلیت اعتماد dependability، قابلیت confirmability، انتقال transferability قابلیت تأیید Guba & Lincoln استفاده شد (۱۹). در این مطالعه به منظور دستیابی به صحت داده ها از روش درگیری طولانی مدت در پدیده مورد بررسی استفاده شد و محققین در طول مطالعه به مدت یک سال با داده ها درگیری مداوم داشتند، همچنین یافته های معنایی حاصل از تحلیل محتوا به رویت و تایید مشارکت کنندگان پژوهش می رسید و در صورت برداشت نادرست اصلاح می گردید member check، روش دیگری که جهت استحکام داده ها بکار رفت استفاده از ناظرین بیرونی همچنین برای حسابرسی تحقیق، محقق مراحل و روند تحقیق را به طور دقیق ثبت و گزارش نمود تا امکان پیگیری تحقیق

جدول ۱: جدول وضعیت جمعیت شناختی مشارکت کنندگان تحقیق

جنس	مرد ۹ نفر (۷۵ درصد)	زن ۳ نفر (۲۵ درصد)
وضعیت تأهل	مجرد ۴ نفر (۳۳ درصد)	متاهل ۸ نفر (۶۷ درصد)
سن	میانگین ۳۰ سال	حداقل ۲۰ سال
محل ناتوانی جسمی	اندام تחתانی ۵ نفر (۴۲ درصد)	تחתانی و فوقانی ۳ نفر (۲۵ درصد)
مدت مصدمومیت	میانگین ۱۲ ماه	حداقل ۳ ماه
وضعیت تحصیلی	سیکل ۲ نفر (۱۷ درصد)	دیپلم ۵ نفر (۴۱/۵ درصد)
وضعیت شغلی	شاغل ۱۰ نفر (۸۳ درصد)	بیکار ۰ نفر (۰ درصد)

و می رفت نه به حرفامون گوش میکردن، نه هیچ وقی می اومندند تو اتاق و میرفتن گاهی از درد پاهم شکایت میکردم و بهشون می گفتم اونهایم با بی اعتنایی رد می شدند و می رفتند. «(شرکت کننده مرد ۳۰ ساله با معلولیت پا).

«تو این مشکلی که برآم پیش اومده بود نیاز به رسیدگی و توجه بیشتری کادر درمانی داشتم، بیان پیشم بهم دلداری بدن، بالاخره من قبل اسالم بودم مثل اونها و حالا این بلا سرم اومده بود، احساس تنهایی میکنم کاش اینجام مث کشورهای پیشرفته بیشتر بداد مریض می رسیدن». (شرکت کننده مرد ۳۳ ساله با معلولیت دست و پا).

(۲) نیاز به حمایت اجتماعی: حمایت اجتماعی به عنوان یکی از اجزاء مهم برای توانبخشی موفقیت آمیز ناتوانی جسمی بعداز تصادف بود. مشکلات و عوارض مصدمومیت جسمی بدنیال حادثه ترافیکی استرس فوق العاده ای را بر بیمار و اعضا خانواده

بر اساس یافته های مطالعه سه طبقه اصلی این مطالعه شامل (الف) نیاز به قرار گیری در چتر حمایتی، (ب) نیاز به تداوم مراقبتی، و (ج) نیل به استقلال ظاهر گردید که هر کدام دارای زیر طبقاتی بشرح ذیل بودند:

الف) نیاز به قرار گیری در چتر حمایتی: چتر

حمایتی، طبقه اصلی استحصال شده در این مطالعه بود که شامل زیر طبقات، (۱) نیاز به حمایت توسط تیم مراقبتی، (۲) نیاز به حمایت اجتماعی و (۳) گرایش به معنویات بود.

(۱) نیاز به حمایت توسط تیم مراقبتی: یکی از زیر طبقات مشخص شده از تجارب مشارکت کنندگان، حمایت توسط تیم مراقبتی بود. مشارکت کنندگان حمایت اشخاصی همچون پزشکان، پرستاران، فیزیوتراپیست ها و غیره را عامل مهمی در بازگشت به جامعه تلقی می کردند.

«اگر اونها من توجه بیشتری میکردن من شاید زودتر خوب می شدم میومدن یک ویزیت سریع می کرند پرستار هم سریع دارو میداد

درونى بود. توجه به معنویات در موافقت از بیماران باعث تقویت برگشت سریعتر بیماریه حالت عادی بود.

«خداشفام داده، من حالم خیلی بد بود، با ویلچر می رقصم و خدا بهم کمک کرد، اصلا نمی تونستم راه برم و کارامو انجام بدم، ولی الان خدارو شکر همه چی خوبه و من شکر گذارم». (مشارکت کننده مرد ۲۴ ساله با مصدومیت پا)

«تو بخش که بودم شیخی که بپوشون اعتقاد داشتم او مدد پیشم، با هام صحبت کرد، قبلش من نمیتوانstem قبول کنم پا مو برا همیشه از دست دادم ولی بعد از اون واقعا احساس کردم که بدون پا هم میتونم زندگی کنم». (مشارکت کننده مرد ۳۰ ساله با مصدومیت نخاعی).

شرکت کنندگان در این پژوهش نیروی مافوق بشری را در رسیدن به سازگاری و رضایت خود می دانستند و از این بابت شکر گذار بودند:

«در صورتی که نقش معنویات یعنی اونچه که به بیمار از نظر روحی کمک و به آدم آرامش میده از بعد برگرداندن شخص بسیار مهم و حائز اهمیت هست و با تمام اون چیزی که بیمار به اون اعتقاد داره به او کمک کردن است قرآن خوندن و گرایشم به توسل به معنویات در بازتوانی و برگشت بهترم به زندگیم اتفاق افتاد و منو به حالت عادیم برگردوند». (مشارکت کننده مرد ۴۲ ساله با معلولیت پا).

ب) نیاز به تداوم مراقبتی: یکی از طبقات اصلی این مطالعه نیاز به تداوم مراقبتی بعنوان یکی از دغدغه های اصلی مشارکت کنندگان مطالعه اخیر بود. این طبقه اصلی شامل زیر طبقات ۱) رهایی در جامعه و ۲) جستجوی دانش مراقبتی بود.

۱) رهایی در جامعه: رهایی در جامعه یکی از مهم ترین دغدغه های مشارکت کنندگان بود بطوریکه بعد از خروج بیمار از بخش امکان دستیابی به بیمارستان یا مرکز درمانی با کادر متخصص برای ادامه دریافت مراقبت را بسیار ضعیف می پنداشتند:

«ما محدودیت داریم بعد از ویزیت ها اول بعد از ترخیص با همین معلولیتها تو جامعه رها میشیم و نمیتوینیم به جایی دسترسی پیدا کنیم، ما میخواهیم که بتونیم کارها و مشکلات پزشکیمونو بیگیری کنیم ولی نمیدونیم چطوری». (مشارکت کننده مرد ۲۷ ساله با معلولیت پاها).

او وارد کرده بود و نیاز به حمایت اجتماعی قوی توسط شرکت کنندگان در این پژوهش تجربه شده بود:

«هیچ منع حمایتی در برای کم کردن بار این رنج و سانجه خسارات بار ما رو نمیده ». (شرکت کننده زن ۲۸ ساله با ضایعه نخاعی و معلولیت یک پا).

«ما موندیم و یه عالمه قرض و قوله واسه کارهایم. دفعه اول هزینه ها رایگان شد ولی بقیه کارهای همه با مشکلات متعددی همراه بود و مجبور بودم واسه همه اینکارا خودم هزینه هاشو بپردازم». (مشارکت کننده مرد ۳۳ ساله با معلولیت دست و پا).

«سازمان بهزیستی اصلاح کمکی به ما نمی کنه تو این موقعیت یکی باید دستتو بگیره» (مشارکت کننده مرد ۳۳ ساله با معلولیت دست و پا).

مشارکت کنندگان بیان کردند که هیچ مرکز قوی و مشاوره ایی که متشکل از تیم های قوی و متخصص و آشنای امور بیماران تصادفی و خانواده اشون که در موقع نیاز برای بسیاری از آنها دچار مشکلات مالی و خانوادگی بتوانند به آنان مشاوره بدهند وجود ندارد:

«ما در سطح جامعه هم تنها بیم، وقتی مشکل پیدا می کیم کسی نیست که به مشکلات ما رسیدگی کنه، ببینید مشکلات ما یکی دو تا نیست مثلا اکثر ما مشکلات روحی پیدا کردیم نیاز به مشاوره داریم، بازم اینکه بیشتر ما مشکلات مالی پیدا کردیم، رفت و آمد از یه طرف، از دست دادن کارایی و شغلها مون از طرف دیگه، تازه کلی هم مشکلات خانوادگی تو این بین برامون بوجود اومده که به یه منبع همیشگی مشاوره و حمایت نیازه که نیست». (مشارکت کننده مرد ۳۵ ساله با معلولیت دست و پا).

برخی شرکت کنندگان نیاز به مشاوره و شرکت درگروه و انجمن همتایان را در بهبودی خود موثر می دانستند:

«وقتی تنها بودم واقعا احساس می کردم که دیگه یه آدم بیخود شدم که دیگه از پس هیچ کاری بر نمیام ولی بعد از آشنایی با انجمن و دوستام واقعا احساس میکنم آدم مفیدی هستم و هیچ کس مثل همدردای آدم نمیتوانه به آدم کمک کن، اینجا دیگه همه بهم کمک می کنیم و احساس میکنم مثل آدمهای عادی شدم». (مشارکت کننده مرد ۲۸ ساله با معلولیت پا).

۳) گرایش به معنویات: یکی از زیر طبقات استخراج شده از تجربیات مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر، حامی

عوارضی متوجه شرکت کنندگان شده بود که فرآیندهای برگشت آنان به جامعه را مختلف کرده بود.

ج) نیل به استقلال: نیل به استقلال یکی از طبقات اصلی مطرح شده در این مطالعه بود. شرکت کنندگان بیان می کردند که بتدریج به توانایی لازم در فعالیتها و مراقبت از خود دست یافتنند:

«الآن خودمم با عصا راه میرم. تنهایی میتونم حموم برم، در صورتی که قبل اینطوری نبودم و تو شش ماه قبل انقدر ضعف جسمی داشتم که نمیتونستم از در خونه حتی برم تو کوچه.»
(مشارکت کننده مرد ۳۵ ساله با معلولیت دست و پا).

«روزهای اول همچ تو رختخواب بودم ولی بتدریج از رختخواب بلند شدم به خودم میگفتم اینطوری که نمیشه کارامو دیگران انجام بدن، خودم باید بتونم همه کارامو انجام بدم.» (مشارکت ۴۲ ساله مرد با معلولت یا).
کننده

برخی شرکت کنندگان برای نیل به خودمراقبتی، بیشتر از
توواناییهای باقیمانده خود استفاده می کردند:
«الآن هم با عصا راه میرم و میام سر کار، راه میرم با این
وضعیت چون باعث میشه عضلات پام تقویت بشه و روحیم بهتر و
زودتر به حالت عادی برگردم، آمدن به محل کار با وجود به اتمام
نرسیدن روزهای استعلامی ام بود، خیلی خوشحالم میام
انشاء الله سالم باشم و بیام». (مشارکت کننده مرد ۲۴ ساله با معلولیت
دست و با).

همچنین تعدادی از یافته های تحقیق بهمراه نقل قول هایی، مددجویان در جدول ۲ آمده است.

بعد از تصادف ما با صدمات و ناتوانیهای میریم خونه و مشکل یکدفعه باعث ایجاد مشکل در جسم روان و زندگیمون میشه و باید کسانی باشند که حمایتمنون کنن، کمک کنن مریض سریعتر پهلووی پیدا کنه». (مشارکت کننده مرد ۲۸ ساله با معلولیت دست و پا).

مشارکت کنندگان بیان کردند ایجاد مشکل و ناتوانی جسمی در آنان تا مدتی پیگیری مرتب میطلبید ولی این حمایتها متأسفانه بعد از ترخیص قطع میشود و بیمار باید با مسائل مختلف سلامتی مواجه و مجبور به مواجهه با آنها به تنها بی یا بشکل دریافت مراقبت خصوصی، غیر متمرکز با صرف هزینه گراف و چالشهای فراوان می باشد.

۲) جستجوی دانش مراقبتی: مشارکت کنندگان برای

بازگشت موفقیت آمیز به جامعه در این مطالعه به جستجوی دانش مراقبتی توسط تیم مراقبتی برای کمک به بیهوادی خود نیاز داشتند:

نمیدونم چطور باید با عصا راه برم دوست دارم خودم کارهای
انجام بدم ولی نمیدونم چطوری باید کارهایم انجام بدhem هیچ کسی
نحوه مراقبت از خودم رو بمن یاد نداد، در صورتی که اگه اطلاعاتی
که بهم میدادن من سریعتر راه می افتادم و کارهای روزمره رو انجام و
به کارم برمی گشتم». (مشارکت کننده مرد ۳۳ ساله با معلویت دست
با) و

وقتی میخوام از خودم مراقبت کنم باید اطلاعات داشته باشم یه دفترچه هایی برای مراقبت بهمون دادند ولی کاش بیشتر از اینا بهمون توجه می شد، من بتونم با این مستله ای که برام پیش اومنده چکار کنم زخم بستر نشم، چطور باید تو خونه مواظب این باشم که عفونت تنفسی نگیرم، عفونت تنفسی منو چند ماه از همه چی انداخت و تاسر حد مرگ رفتم در صورتی که با کوچکترین اطلاعات و وقت گذاشتن پرسیل زودتر سر پا می شدم.» (شرکت کننده مرد ۲۰ ساله با ضایعه نخاعی).

با جستجوی اطلاعات لازم در مشارکت کنندگان امکان مشارکت آنان در خود مراقبتی افزایش می یافتد و یکی از نیازهای اساسی این بیماران برای برگشت به وضعیت قبلی تامین می شد ولی متاسفانه بدلیل غفلت از اموزش در بسیاری موارد

جدول شماره ۲: طبقات و زیر طبقات و نمونه های از نقل قول های استخراج شده از یافته ها

طبقات اصلی	زیر طبقات	کدها	منتخبی از نقل قول ها
گرایشات معنوی	استعانت از خدا، پذیرش معلویت بواسطه اعتقادات مذهبی		خدا باید کمک کنه تا همه چی درست بشود و اسه همین من فقط از خدا می خواهم. (مشارکت کننده مرد ۴۲ ساله) قسمت همین بوده است راضی هستم به رضای خدا (مشارکت کننده زن ۳۲ ساله)
نیاز به حمایت توسط تیم مراقبتی	نیاز به توجه بیشتر کادر درمان به مشکلات جسمی بیمار، نیاز به رسیدگی و توجه بیشتر از طرف کادر درمانی		وقتی برای کوچکترین کارها مثل رفتن از روی تخت روی ویلچر نیاز به کمک داری و روت هم نمی شود دائم مزاحم دیگران شوی یک مشکل بزرگی است (مرد ۳۵ ساله)
الف) نیاز به قرارگیری در چتر حمایتی	تنهای بودن در سطح جامعه، نیاز به رسیدگی به مشکلات اجتماعی نیاز به حمایت اجتماعی		خیلی خوبی که پرستاران با ما حرف بزنند و حرفهای ما را گوش کنند ولی سرشنون شلوغه و کمتر این اتفاق می افته (زن ۲۸ ساله)
ب) نیاز به تداوم و استمرار مراقبت	خسارات قابل توجه، بار مالی بر خانواده کم شدن آلام با بودن در جمع هم تایان، سرپرستی در انجمن جامعیت ناکافی اطلاعات برای انجام جستجوی دانش مراقبتی	کم شدن آلام با بودن در جمع هم تایان، سرپرستی در انجمن جامعیت ناکافی اطلاعات برای انجام مستقلانه امور، نیاز به آموزش	کمتر کسی ما را می فهمه بیشتر به ما نگاه ترجم امیز دارند و احساس می کنم کسی ما را درک نمی کنه داشتم یک نفر که همدلی کنه خیلی مهمه (مرد ۳۶ ساله) ما تفریح و سرگرمی نداریم، دوستان چندانی نداریم، گردش نداریم، کلوب نداریم از امکاناتی که افراد سالم دارند نمی توانیم استفاده کنیم و امکانات خاص ما هم وجود ندارد (مرد ۴۰ ساله)
ج) نیل به استقلال	دریافت ناکافی خدمات بازتوانی ، رهایی در جامعه	فقدان خدمات پیگیری	خرج دارو درمان ما زیاده، هزینه رفت و امد برای توانبخشی و فیزیوتراپی و... زیاده، خانواده حورکش ما شده گاهی موقع از خانواده ام خجالت می کشم که این همه زحمت بپشون می دم (زن ۲۰ ساله)
			تنها وقتی که یک کم غم هایمان بادمان می رود وقتی هست که با بچه های انجمن هستیم (مرد ۴۰ ساله)
			اگر بدونیم که چطوری باید از خودمون مراقبت کنیم ، مثلا چکار کنیم عفوونت اداری نگیریم یا چکار کنیم که پامون زخم نشه کمک بزرگیه (مرد ۳۳ ساله)
			ما خیلی کارها را برای مراقبت از خودمون الاختکی یاد گرفتیم یا از بقیه مريض ها ياد گرفتیم کسی يادمون نداد (زن ۲۰ ساله)
			در سطح جامعه مراکزی که به معلومین خدمات خاص به انها ارائه می ده وجود نداره و مراکزی هم که هست بیشتر برای افراد عادی است تا معلول (زن ۲۸ ساله)
			کسی احوال ما را نمی پرسه مگر اینکه خودمون بريم دکتر و گرنه کسی بفکر وضعیت ما نیست (مرد ۲۰ ساله)
			در بیمارستان وقتی بستری هستی بیشتر بهت می ولي وقتی مرخص می شی و میری خانه دیگه از يادها می ری از قدمی گفتند از ياد برود هر انکه از دیده برفت (مرد ۳۶ ساله)
			سرکار رفتن، خرید کردن و تو مردم بودن خودش نعمتی است (زن ۲۰ ساله)
			اینکه بتوانی کارات را خودت بکنی مثلا بتونی حمام کنی و یا لباسات را عوض کنی و یا بری در کوچه را باز کنی نعمت بزرگیه، من الان قدر اینها را می دونم (مرد ۳۰ ساله)

تا در عکس العمل‌های عاطفی یکدیگر شریک و سهیم شوند. وی تاکید می‌کند که حمایت بیماران از یکدیگر باید تشویق شود و به وسیله بیمارستانها مساعدت و یاری لازم انجام پذیرد بیمارستانها باید منابعی را در نظر بگیرند و حمایتی را فراهم کنند تا گروه‌های حمایتی رونق بگیرن، اما مسئله مهم در مورد این گروه‌های حمایتی این است که این گروه‌ها باید دارای رهبران آموزش دیده برای پیشگیری از ترویج و اشاعه اطلاعات غلط یا فضای منفی بین اعضاء گروه باشند علاوه بر این رهبر ماهر و متخصص قادر است که اعضای گروه را مدیریت کند (۲۴)، همچنین شرکت کنندگان در این مطالعه، نیاز به حمایت تبییمی را عامل موقوفیت بزرگی در سازگاری با مسائل و ناتوانیهای بوجود آمده بعد از تصادف می‌دانستند. و تعامل مطلوب تبییم مراقبتی را عامل بازیابی دوباره سلامتی و تعادل در آنها بیان می‌کردند، که البته این یافته‌ها با یافته‌های مطالعه فرازن و همکاران (۲۰۰۶) و همچنین پدن (۲۰۰۴) همخوانی دارد. یافته‌های این دو مطالعه گزارش می‌کنند که مصدومین جسمی حوادث ترافیکی در بازگشت مجدد سلامتی خود در شک و ابهام بوده و برای بازگشت به زندگی عادی تلاش زیادی می‌کنند ولی نیاز شدید به در یافت حمایت و امنیت توسط تبییم توانبخشی خصوصاً پرستاران را از ضروریات بازگشت به زندگی نرمال تلقی می‌کنند (۲۵،۶) گرایش به معنویات نیز از منابع حمایتی دیگر برای بیماران بوده است. یافته‌های این مطالعه حاکی از آن بود که مشارکت کنندگان با استناد بر اعتقادات مذهبی و تقویت حس معنویت باعث کنار آمدن و حمایت درونی آنان در برابر صدماتی افزون بر ناتوانی فیزیکی آنان و در نتیجه تسلیم در برابر خداوند و سازگاری با این نوع زندگی شده بود، در مطالعه پاشایی و همکاران (۱۳۹۰) که در درک تجربه بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام شد معنویت بعنوان یک جنبه درونی و مکمل در شخص با بیماری مزمن مرتبط که مرتبط با کیفیت زندگی در مددجو است، معرفی گردید (۲۶). همچنین، در مطالعه ایی دیگر معنویت عامل موثر در همه جنبه‌های سلامت شخصی می‌باشد (۲۷) و در مطالعه بابا محمدی (۱۳۹۱) هم بیماران با ضایعات نخاعی گرایش به معنویات را از عوامل موثر

بحث

بر اساس یافته‌های این مطالعه سه طبقه اصلی این مطالعه شامل نیازبه قرار گیری در چتر حمایتی، نیاز به تداوم مراقبتی، و نیل به استقلال، مفهوم پردازی شد.

یافته‌های این مطالعه نشان داد که نیاز به قرار گیری در چتر حمایتی یکی از طبقات اصلی مطرح می‌باشد بطور یکی یکی از ارکان مهم بازگشت به جامعه در مصدومین نیاز به حمایت است. این طبقه اصلی شامل سه زیرطبقات شامل نیاز به حمایت تبییمی، گرایش به معنویات و حمایت اجتماعی می‌باشد. اصولاً ماهیت صدمه باعث، تغییر و محدودیت در روتینهای زندگی و کسب یکسری تغییرات منفی در بیمار همچون محدودیت توانایی جسمی، محدودیت کنترل، تغییر در نقشهای خانوادگی و اجتماعی می‌شود (۲۱،۲۰). طبق گزارشات حمایت اجتماعی و حمایت مالی بیماران باعث حس اعتماد بنفس در بیماری شود (۲۱،۲۲). نتایج مطالعه اوهار والیس و مورفی (۲۰۱۱) گزارش می‌کند که حمایت اجتماعی به هر شکل (درک شده، واقعی، ساختاری)، با عملکرد بهتر متعاقب با صدمه همراه بوده و بهترین شاخصهای پیامدهای موفقیت آمیز (فعالیتهای کاری و خانه داری، بیرون رفتن، خود مراقبتی، مشارکت در جامعه، درک و برقراری ارتباط) می‌باشد. نتایج مطالعه نشان داد که حمایت اجتماعی احساس رفاه را ارتقاء می‌بخشد. حمایت اجتماعی ساختاری همانند پیوستن به جامعه اثر مستقیمی بر روی سلامتی با افزایش دسترسی به حمایت اجتماعی ایجاد کرده و یک وضعیت ذهنی مطلوب را تولید می‌نماید (۲۳). از منابع دیگر مطرح شده توسط بیماران که از آن بعنوان نیروی حمایتی یاد کردند، بهره‌گیری از انجمن حمایتی و حمایت همتایان بود که شرکت کنندگان این پژوهش آنها در کاهش استرس و تحمل شرایط آسیب زا و ناتوان کننده خود موثر می‌دانستند؛ که در این زمینه یافته‌های این مطالعه با مطالعه وین رایت همخوانی دارد زیرا وی معتقد است که گروه‌های حمایتی همتایان یک تربیون آزاد برای بحث در مورد مسایلی که متقابلاً دغدغه افراد است و در نتیجه بیماری آنها به وجود آمده است، فراهم می‌کند و همین طور فرصتی را برای افراد فراهم می‌کند

پس از ترخیص در جامعه رها می شود. این یافته های این مطالعه با مطالعه کریستین و همکاران در سال ۲۰۱۱ با عنوان بررسی نیازهای بازتوانی بیماران ترخیص شده از مرکز ترومای ناحیه ایی آفریقا تطابق داشت نتایج این مطالعه حاکی از ان بود که تنها مددجویانی که نقص عملکرد جسمانی قابل توجه داشتند تحت پیگیری پس از ترخیص قرارمی گیرند و بیشتر بیماران با صدمات ناشی از ناتوانی عملکرد جسمانی تا زمان بازگشت به وضعیت عادی تحت پیگیری تحت قرار نمی گیرند (۳۱). در حالیکه در مدل سیستمی تروما بصورت زنجیره وار تاکید بر تمامی مراحل مراقبت از مراقبت حد تا بازگشت به جامعه است (۳۲,۳۳). آنچه یافته های این مطالعه گزارش می کنند مبتنی بر عدم پیگیری درمانی بیمار پس از ترخیص است و این مسئله برخلاف آنچه در مدل سیستمی تروما مطرح و اعتقاد بر این اصل که مراقبت توانبخشی و توجه به نیازهای بیمار از زمان صدمه تا برگشت به جامعه ادامه دارد، می باشد.

نتیجه گیری نهایی

نیازهای شناخته شده در این تحقیق شامل، قرارگرفتن در چتر حمایتی، نیل به استقلال و تداوم مراقبت ها باید در طراحی برنامه های مراقبتی مددجویان سوانح ترافیکی گنجانده شود. لذا پیشنهاد می گردد، برای دستیابی ناتوانان جسمی ترافیکی به استقلال، فراهم نمودن حمایت کافی آنها و در دسترس قراردادن و تداوم مراقبتها برای ناتوانان جسمی حوادث ترافیکی، از رویکرد توانبخشی خانواده و جامعه محور با استفاده از مدل توانبخشی جند بعدی فراگیر (۳۴) که می تواند هر سه دسته نیاز فوق تامین نموده و پوشش دهد، استفاده گردد.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل یافته های رساله دکتری پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بوده که توسط کمیته اخلاق شورای پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تصویب و مجوز کتبی جهت انجام تحقیق اخذ گردیده است. تیم تحقیق ضروری می داند که از کلیه دست اندکاران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مسئولین محترم دو بیمارستان تخصصی تحت پوشش دانشگاه علوم پژوهشی تهران و ایران و کلینیک های

در سازگاری خود دانسته اند. معنویات و تسليم شدن در برابر امر خداوند را از موارد مهم کنار آمدن با بیماری و عوارض ناشی از بیماری مطرح نمودند (۲۲) که البته یافته های این مطالعه با یافته های مطالعات مذکور هم راستا می باشد.

از یافته های مهم دیگر این مطالعه، نیل به استقلال بود. در این مطالعه، بیشتر مشارکت کنندگان از استراتژی نیل به کسب استقلال برای بازگشت موفقیت آمیز به زندگی استفاده کردند. این یافته ها با مطالعه پریور و بازیو (۲۰۱۰) و مک کینلی (۲۰۰۲) نیز تطابق دارد که استقلال مشارکت پذیری بیمار با ناتوانی جسمی را افزایش داده و او را به سمت زندگی مستقل سوق می دهد (۲۸,۲۹). همچنین، نیاز به کسب اطلاعات به عنوان یکی از نیازهای بسیار مهم در مشارکت پذیری بیمار بوده و باعث کاهش آسیب پذیری بیماران و پیامدهای ناشی از بیماری گزارش شده است (در حقیقت، کسب بیشن و شناخت در زمینه صدمه و چالشهای پیرامون آن باعث روشن شدن نقاط مبهم و تاریک شکل گرفته در اذهان مبتلایان، کاهش تنفس و ترس و متعاقباً توانایی تطابق بهتر با شرایط پیش رو و متعاقباً توانایی تطابق بهتر با شرایط پیش رو میگردد (۳۰)). مسئله دیگر نیل به خود مراقبتی برای سازگاری با موقعیت جدید بود که شرکت کنندگان در این پژوهش، آن را به عنوان تلاشی برای کاهش آسیب پذیری ناشی از بیماری و افزایش کیفیت زندگی خود تجربه کردند. آنان بتدریج با مشکلات و ناتوانی بوجود آمده بوسیله صدمه کنار آمده و به استقلال و خود یابی دست یافتند که این مسئله نشاندهنده تطابق موثر آنان با ناتوانی بوجود آمده و پذیرش موقعیت فعلی بود. این مسئله میتوانست بدليل رضایتمندی شرکت کنندگان مطالعه از موقعیت جدیدی باشد که باعث کنار آمدن آنان با خود و کاهش فشارهای واردہ بر آنها باشد. مسئله دیگر در آنان، ایجاد حس یک شخص جدید و دگرگون شدن زندگی آنان در نتیجه اعطای این شانس دوباره و درک ارزش زندگی بدست آمده باشد. نیاز به تداوم مراقبتی در بیماران، یافته دیگری بود که توسط بیماران با ناتوانی فیزیکی دیده می شد. شرکت کنندگان بیان میکردند که بیمار تا زمانی که در بیمارستان است، تحت مراقبت و درمان قرار می گیرد و

قدرتانی بعمل می آید.

بازتوانی وابسته به این مراکز و همچنین مشارکندگان تحقیق

که بدون همکاری آنها، انجام این مطالعه ممکن نبود تشکر و

منابع

- 1- Khan F, Amatya B, Hoffman K. Systematic review of multidisciplinary rehabilitation in patients with multiple trauma. *Br J Surg.* 2012;99 (1):88-96.
- 2- World Health Organization. Global status report on road safety: time for action. Geneva: WHO, 2009.
- 3- Finkelstein EA, Corso PS, Miller TR. The Incidence and economic burden of injuries in the united States. New York: Oxford University Press, 2006.
- 4-Helene Lundgaard S, Erik B. Roise O, Arnstein F. Long-Term multidimensional functional consequences of severe multiple injuries two years after trauma: a prospective longitudinal cohort study. *The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care.*2007;62(2): 461-470
- 5-Wraa C.(2012). Caring for the patient with multiple-system trauma. <http://www.amtrauma.org/>- American Trauma Society.
- 6- Solberg HL, Bautz-Holter E, Raisle O, Finset A. Long-term multidimensional functional consequences of severe multiple injuries two years after trauma: a prospective longitudinal cohort study. *J Trauma.* 2007;62(2):461-70.
- 7- Peden M, Scurfield R, Sleet D, Mohan D, Hyder A, Jarawan E. World report on road traffic injury prevention. Geneva: WHO, 2004.
- 8- Russell AN .How individuals with traumatic injuries manage their lives following a motor vehicle accident crash, PhD thesis, Kent -State University ,College of Nursing;2008.
- 9- Kosar S, Seelen HA, Hemmen B, Evers SM, Brink PR. Cost-effectiveness of an integrated 'fast track' rehabilitation service for multi-trauma patients involving dedicated early rehabilitation intervention programs: design of a prospective, multi-centre, non-randomised clinical trial. *J Trauma Management Outcomes;* 2009;30;3:1.
- 10- Cooper G. HRSA model trauma systems planning and evaluation. from <http://www.emsa.ca.gov/systems/files/trauma/ModelTraumaPlan>. Model Trauma Systems Planning & Evaluation,2008.
- 11- Douglas B. Pattern of injury in motor vehicle accidents .world wide wound.2002.
- 12- Wood JP, Connelly DM, Maly MR. Getting back to real living: a qualitative study of the process of community reintegration after stroke. *Clinical Rehabilitation.*2010; 24(11): 1045-1056.
- 13- Miller A, Clemson L, Lannin N. Measurement properties of a modified Reintegration to Normal Living Index in a community-dwelling adult rehabilitation population. *Disability and Rehabilitation.*2011; 33(21): 1968-1978.
- 14- McColl MA, Davies D, Carlson P, Johnston J, Minnes P. The community integration measure: Development and preliminary validation. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,*2001; 82(4): 429-434.

- 15- Samuelkamaleshkumar S, Radhika S, Cherian B, Elango A, Winrose W, Suhany BT, Prakash MH. Community Reintegration in Rehabilitated South Indian Persons With Spinal Cord Injury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2010; 91(7): 1117-1121.
- 16- Butcher H, Ruston S. The perceptions and expectations for rehabilitation and return to work, in orthopedic road trauma victims: a qualitative study in north Queensland.10th national rural conference;17-20 may 2009.
- 17- Hsieh HF, Shannon E.S. Three approaches to qualitative content analysis, Journal of Qualitative health research,2005; 15(9): 1277-128.
- 18- Pope C, van Royen P, Baker R. Qualitative methods in research on healthcare quality. Qual Saf Health Care. 2002;11:148–152.
- 19- Holloway I, wheeler. Qualitative research in nursing . 2th ed .London . Blackwell science. ;2010.
- 20- Jenkinson C, Coulter A, Bruster A, Richards N, ChandalaT. Patients experiences and satisfaction with health care: results of a questionnaire study of specific aspects of care. Quality and Safety in Health Care. 2002;11,335–339.
- 21- Webster RA, thompson DR, mayou RA. the experiences and needs of Gujarati hindu patients and partner in the first month after a myocardial infarction , 2000, 1(1): 69-7.
- 22- Babamohamadi H, Negarandeh R, Dehghan-Nayeri N. Coping strategies used by people with spinal cord injury: a qualitative study. spinal Cord. 2011;49(7):832-7.
- 23- Ohare MA, walls L, Murphy GC. social support paris predict daily functioning following traumatic spinal cord injury: An exploratory study, the open rehabilitation journal,2011;4:51-58.
- 24- Wainwright SP, Fallon M, Gould D. Psychosocial recovery from adult kidney transplantation: a literature review. J Clin Nurs. 1999 ;8(3):233-45.
- 25- Franzén C, Björnstag U, Jansson L. Injured in traffic: Experiences of care and rehabilitation, Accident and Emergency Nursing. 2006; 14 :104-110
- 26- Pashaei F, nikbakht nasrabadi AR, karami kabir N. life with hemodialysis machine, Iranian Journal of Critical Care Nursing .2011; 4(2): 59-66..(Persian)
- 27- Lubkin I, Larson PD. Chronic illness: Impact and interventions (5th ed.). Sudbury, MA: Jones & Bartlett.2002.
- 28- Pryor J, Buzio A. Enhancing Inpatient Rehabilitation Through the of Patients and Nurses. Advanced Nursing J. 2010;66(5): 978 – 987.
- 29- McKinley S, Nagy S, Stein-Parbury J, Bramwell M., Hudson J. Vulnerability and security in seriously ill patients in intensive care. Intensive and Critical Care Nursing . 2002 ;18: 27–36.
- 30- Pryor J. A Nursing perspective on the relationship between nursing and Allied Health in inpatient rehabilitation. Disability & Rehabilitation. 2008; 30 (4):314-22.
- 31- Christian A, González-Fernández M, Samuel Mayer R, J Ha A. Rehabilitation needs of persons discharged from an African trauma center, Pan Afr Med J. 2011; 10:32.
- 32- Delprado M. Trauma systems in Australia. Journal of trauma nursing.2007; 14(2):93.

33- Harms. After the accident: survivors perceptions of recovery following road trauma.
Australian Social Work. 2004;57(2):101–213.

Rehabilitation needs of patients with physical disabilities due to traffic accidents for returning to the community: a qualitative study

Pashaei Sabet F¹, Norouzi Tabrizi K², Khankeh HR³, Fallahi Khoshknab M⁴

Abstract

Introduction: Increase in road traffic accidents has led to increase in various degrees of injuries and disabilities with various physical limitations and disabilities. Fortunately, increasingly advances in sophisticated medical, nursing and rehabilitation sciences has led to most people with physical disabilities, would have been able to return to the society. In order to return to the community the needs of people with disabilities should be well known as well as their presence in the community to be provided. The purpose of this study was to understand the rehabilitation needs of patients with physical disabilities from road traffic accidents to return to the community.

Methods: A qualitative approach using conventional content analysis was adopted. 12 participants of both genders and age ranged between 18-45 years old with at least 3months physical disability in upper and lower limbs or spinal cord injury of two specialized hospitals and clinics affiliated to Tehran and Iran Universities of Medical Sciences were selected through purposive sampling. Data collected through in-depth semi-structured interviews and continued until data saturation. Data analysis was done continuously and simultaneously with data collection. Also constant comparison method with conventional content analysis approach was used.

Findings: Three themes emerged from the data analysis, including: (a) the need to be under the umbrella of support, (b) the need for continuity of care and (c) achieving independence. In fact, the needs of the clients were getting support from others, including family and community, continuity of care throughout their disability and the need for independence.

Conclusion: The needs identified in this study should be included in the designing of client care plans. Therefore, to achieve the independence of the physically disabled due to traffic accidents, providing sufficient support as well as the availability and continuity of care is suggested. Also a multi-dimensional rehabilitation model with the family and community-based rehabilitation approach should be used to provide the necessary cover to these three categories.

Keywords: Accidents, Physical disability, Traffic accident, Qualitative research, Rehabilitation, Nursing, community

1- PHD student of Nursing, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

2- Assistant Professor of University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. (**Corresponding author**)

E-mail: dr.kian_nourozi@yahoo.com

3- Associate Professor of University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

4- Associate Professor of University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing

Vol.1 No.1 Fall 2014

Effect of Multi - Sensory Stimulation on memory in Nursing home residents in Ahvaz.....	1
Moghaddasifar I, Fakharzadeh L, Fereidooni Mohamad M, Haghghi Zadeh H	
The effect of hope based group therapy approach on the severity of depression in multiple sclerosis patients.....	12
Bahramian J, Zahrakar K, Rasouli M	
Quality of life and its associated factors in primary family caregivers of children with physical disabilities under supervision of welfare organization Iran- Ilam.....	23
Hosseini E, Seyedeh Fatemeh Haghdoost Oskouie, Khanjari S, Heidari M, Ghodusi M	
The comparison of Emotional Quotient in blinds and low visions with normal sighted people in Shahroud welfare organization, 1392.....	32
Mohsen Dehghani, Monir Nazari	
The effect of an aerobic training program on physical self-concept and self-esteem of nurses.....	42
Saadatmehr R, Nourozi K, Khaledi N, Bakhshian F, Rezasoltani P	
The effect of religious-spiritual care on anxiety post surgery coronary artery bypass graft patients.....	51
Tajbakhsh F, Hosseini MA, Sadeghi Ghahroudi M, Fallahi Khoshkenab M, Rokofian A, Rahgozar M	
Comparing barriers and facilitators of attending to cardiac rehabilitation programs from patients with coronary artery bypass graft surgery and rehabilitation specialists' viewpoints.....	62
Hajali Akbari Z, Hosseini MA, Nourozi K, Rahgozar M	
Rehabilitation needs of patients with physical disabilities due to traffic accidents for returning to the community: a qualitative study.....	74
Pashaei Sabet F, Norouzi Tabrizi K, Khankeh HR, Fallahi Khoshknab M	